"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forraje.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Triazol + Estrobirulina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Trasladar a la personas al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
  SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para peces e invertebrados acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin, para evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Custodia®

32 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Tebuconazole ..... 200 g/l
Azoxystrobin ..... 120 g/l
1,2-benzisotiazolin-3-one..... 0.4 g/l
Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 675- SENASA

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. N° 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
Calle 1C N°7-53 Int Zona Franca
Barranquilla, Colombia

CONTENIDO NETO: **220 LITROS**
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

ADAMA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Custodia 32 SC es un fungicida sistémico con efecto preventivo, curativo y erradicante, de prolongada residualidad que asegura la protección de las hojas, retardando la senescencia y manteniéndolas verdes por más tiempo.
Agitar el envase antes de abrir. Preparar la mezcla de aplicación de acuerdo a las dosis indicadas en el cuadro de usos. Usar las dosis más bajas para aplicaciones preventivas o en estadios iniciales de la enfermedad. Alternar con fungicidas de diferente modo de acción.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	(L/ha)	(L/200L)		
Alcachofa	Oidiosis	*Leveillula taurica*	0.4 - 0.5	-	7	0.6[1]/5.0[2]
	Pudrición gris	*Botrytis cinerea*				
Arroz	Quemado del Arroz	*Pyricularia oryzae*	0.5 - 0.7	-	35	2.0/5.0
Café	Roya del Café	*Hemileia vastratix*	-	0.3	30	0.1/0.03
Cebolla	Mancha foliar	*Stemphylium vesicarium*	0.5	-	14	0.15/1.0
	Pudrición gris	*Botrytis cinerea*	0.4	-		
Espárrago	Mancha foliar	*Stemphylium vesicarium*	0.6	-	20	0.02/0.01
Fresa	Oidiosis	*Oidium sp.*	-	0.20 - 0.25	5	0.1/10
	Pudrición gris	*Botrytis cinerea*	-	0.25 - 0.30		
Maíz	Mancha del Asfalto	*Phyllachora maydis*	-	0.2 - 0.3	15	0.6/0.02
Mandarina	Pudrición gris	*Botrytis cinerea*	-	0.2	15	5.0/15.0
	Alternaria	*Alternaria alternata*	-	0.15 - 0.2		
Mango	Muerte regresiva	*Lasiodiplodia theobromae*	-	0.15 - 0.25	52	0.05/0.7
Melocotonero	Oidiosis	*Sphaerotheca pannosa*	-	0.15 - 0.20	3	1/2
Papa	Tizón temprano	*Alternaria solani*	0.5 - 0.7	-	15	0.02/7.0
	Chupadera fungosa	*Rhizoctonia solani*	0.75 -1.0	-		
Pimiento	Oidiosis	*Leveillula taurica*	0.4 - 0.6	-	7	1.0/3.0
Vid	Oidiosis	*Erysiphe necator*	0.5 - 0.6	0.083 - 0.1	14	6.0/2.0
	Pudrición gris	*Botrytis cinerea*	0.5	0.18 - 0.24		

PC.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos (en partes por millón)
1-Tebuconazole/2 - Azoxystrobin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año para todos los cultivos recomendados en el cuadro de usos.
Ver información sobre intervalo entre aplicaciones y momento de aplicación en la hoja informativa adjunta.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura a excepción de materiales fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Dimensiones: 330 mm x 200 mm

Esta etiqueta requiere Hoja Informativa