

290 mm

Tamaño de letra: 6 puntos

Tamaño de letra: 7 puntos

Tamaño de letra: 7 puntos

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico por inhalación y sensibilizante cutáneo. Evite respirar el polvo o el aerosol de la aspersión. Evite el contacto directo de este producto con la piel y la ropa.
- Almacenar en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicamentos, bebidas o forrajes.
- Utilice todo el equipo de protección personal requerido durante la mezcla, manipulación y aplicación del producto, y para ingresar a las áreas tratadas dentro de las primeras 24 horas después de la aplicación del producto. No manipule el producto en ambientes cerrados, solo en campo abierto.
- No comer, beber ni fumar durante la utilización de este producto o durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Aplicar siguiendo la dirección del viento.
- Después de la aplicación de este producto, cámbiese y lave su ropa contaminada, y lave con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haber estado en contacto con el producto.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Organofosfato.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente al centro de salud más cercano y muéstrelle a médico esta etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir el vómito, ni dar agua ni nada por la boca a una persona inconsciente. Lleve al paciente al centro de salud más cercano.
 - En caso de contacto con los ojos, mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante 15 min. Busque atención médica.
 - En caso de contacto con la piel, quítese la ropa y zapatos. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, traslade al paciente a un lugar fresco y bien ventilado. Proporcione respiración artificial si es necesario. Busque atención médica.

Antídotos: Emplear sulfato de atropina, de 1 a 2 mg cada 15 minutos (intravenosa o intramuscular) hasta síntomas de atropinización o hasta un máx. de 30 mg; también puede administrarse 2-PAM o toxigónin (Merck), en dosis de 1 a 2 g por vía intravenosa lentamente. Para menores de 12 años la dosis inicial es de 0.05 mg/ kg de peso, repitiendo de 0.02-0.05 mg/ kg de peso. Contraindicaciones: morfina, fenotiazinas y teofilina.

Teléfonos de emergencia:
CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811
SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido del producto, enjuague el envase tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Después de realizar el triple lavado, inutilizar el recipiente triturándolo o perforando su base. Deseche el recipiente en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Es obligatorio el triple lavado de este envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Este producto es peligroso para las abejas u artrópodos beneficiosos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Avisar a los apicultores antes de aplicar el producto, para que puedan confinar a sus abejas de manera oportuna.
- Aplicar el producto a primera hora de la mañana o por la tarde.
- Peligroso para peces y otros organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los sobrantes de la aplicación o envases vacíos.
- Establecer una banda de protección de al menos 10 metros de las fuentes de agua.
- No aplique este producto en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en las áreas tratadas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva del producto.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

Rugby® 200 CS

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

CAPSULAS EN SUSPENSION (CS)

Composición

Cadusafos 200 g/L
Aditivos 0 p.s. 1 L

Reg. PQUA N° 911 - SENASA

Titular del Registro:

FMC Latinoamérica S.A. Sucursal
Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208, Interior 705-B,
Torre III. Urbanización Club Golf los Incas. Santiago de Surco, Lima, PERÚ.

Formulado por:

FMC Corporation.
2929 Walnut St. Filadelfia, PA 19104 - Estados Unidos

Importado y Distribuido por:

FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7 San Isidro,
Lima 27 - PERÚ - Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

**Fecha de formulación:**

Número de lote:

Fecha de vencimiento:

CONTENIDO NETO: 20 L

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

FMC y Rugby son marcas comerciales de FMC Corporation y / o una filial.
© 2021 FMC Corporation. Reservados todos los derechos.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Rugby® 200 CS es un nematocida no sistémico que actúa por contacto e ingestión. El nematocida **Rugby® 200 CS** es un organofosforado y como tal inhibe la enzima colinesterasa, sobreexcitando el sistema nervioso del nematodo y finalmente provocando su muerte.

El nematocida **Rugby® 200 CS** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua. Mezclar y completar con agua hasta el volumen requerido. Aplicar con un inyector o Venturi al sistema de riego, asegurándose de que la cinta de riego y los emisores de goteo estén cerca de la planta. Si no hay un sistema de riego disponible, use equipo de aplicación dirigido al cuello de planta, empampandola (drench).

El nematocida **Rugby® 200 CS** DEBE APLICARSE ÚNICAMENTE AL SUELO, NUNCA AL FOLLAJE. El suelo debe estar en capacidad de campo. NUNCA APLIQUE EN SUELOS SECOS O SATURADOS.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO".

Cultivo	Nombre de la Plaga		Dosis L/ ha	P.C. (días)	LMR ppm
	Común	Científico			
Vid	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	10-15	70	0.01
Pimiento	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	15	NA	0.01
Papa	Nematodo quiste de la papa	<i>Globodera pallida</i>	15	102	0.01

P.C.: Periodo de carencia en días

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en ppm (partes por millón)

No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

- Realizar un máximo de una (1) aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año. Dosis máxima 15 L/ha.
- Aplicar cuando se detecte la presencia de la plaga, siendo más cuidadoso en la etapa de desarrollo radicular.
- Si persiste la presencia de la plaga, utilice otro nematocida con un modo de acción diferente para evitar la resistencia del producto.
- No aplicar durante la floración

En vid: Realizar una aplicación, al inicio de la brotación o después de la cosecha.

En pimiento: Aplicar el producto entre 5 - 7 días después del trasplante

En papa: Realice la aplicación al momento de la siembra. Pulverizar en el fondo del surco intentando cubrir la semilla. Forme una banda de 15 a 20 centímetros antes de cubrir la semilla. El campo a tratar debe manejarse bajo el esquema de rotación de cultivos. Se debe realizar una buena preparación del suelo. Se debe realizar un deshierbe manual. Se deben realizar muestreos y observaciones de campo para el monitoreo de plagas. La humedad del suelo debe estar a capacidad de campo. Después de la aplicación del producto, el siguiente riego debe retrasarse el mayor tiempo posible, dentro de las prácticas agronómicas permitidas.

PERIODO DE REINGRESO:

- Se permite el reingreso al área tratada 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:

El nematocida **Rugby® 200 CS** se puede aplicar en mezclas con la mayoría de los plaguicidas, excepto aquellos con reacción alcalina; sin embargo, se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos a aplicar.

FITOTOXICIDAD:

Este producto no es fitotóxico para el cultivo cuando se aplica a las dosis recomendadas y según las indicaciones dadas.

Cadusafos, de acuerdo a la clasificación FRAC pertenece al Grupo N-1B, nematocida.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

150 mm



RT Rugby 200CS 20L Rev03_PE (Farmex).indd 1

10/02/2022 13:59:03

Producto: RT - Rugby 200 CS - 20 L - PE	CORES:
País: Perú - Distribuidor: Farmex	■ PRETO
Revisão: Rev.03 - 26/01/22	■ PANTONE YELLOW C
SKU label atual: n/a	■ PANTONE 199 C
SKU label novo: n/a	■ PANTONE 347 C
JOB: 423/21	■ PANTONE 287 C
Formato RT: 290 mm x 150 mm	■ PANTONE 362 C
Alterações: NOVO TEXTO - ATUALIZACION STEWARDSHIP - PERU Ana - 17/11/21	

Tamaño dos pictogramas: 8 x 8 mm

PE_FT - Rev.03 - 10/02/22