

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar máscara, guantes y gafas protectoras durante el manejo del producto.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un ambiente seco, sombreado y ventilado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada, en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Irritante a la piel y a los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroides.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELEFÓNOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 opción 4
CISPROQUIM: 0800 50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques y fuentes de agua con desechos y envases vacíos ni con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Peligroso para las abejas y nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

DERRIBE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA


Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN:

Permethrin500 g/L

Aditivosc.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 117-SENASA



Point
 ENTREGAMOS CALIDAD



Titular del Registro:
POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto N° 304.
 Urbanización Santa Patricia II Etapa
 La Molina. Lima - Perú
 Teléfonos: (1) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:
POINT INTERNATIONAL LTD.

42 St Margarets Grove Twickenham
 TW 1 1JG United Kingdom
 Teléfono: (44-20) 88923862

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
 Tel.: (01) 617-3300

Contenido Neto: **200 L**

N° Lote
 F. de Form.
 F. De Venc.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **DERRIBE 50 EC®** es un insecticida piretroide de rápida acción que actúa por contacto e ingestión.
- **DERRIBE 50 EC®** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila, según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml / cilindro 200 L	L / ha		
Alcachofa	"Gusano perforador"	<i>Heliothis virescens</i>	200-250	0.4-0.5	0	5
Alfalfa	"Gusano ejército"	<i>Spodoptera eridania</i>	100	0.2	7	25
Cebolla	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	100-150	0.2-0.3	1	0.1
Espárrago	"Gusano del tuirón"	<i>Copitarsia decolora</i>	250	0.5	1	1
Páprika	"Gusano defoliador"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200-250	0.4-0.5	3	10
Tomate	"Polilla"	<i>Tuta absoluta</i>	150	0.3	7	1

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de Carencia

Volumen de agua recomendado: 400 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones pueden repetirse a los 14 días en caso de reinfestación. Se puede aplicar en cualquier etapa fisiológica del cultivo, hasta los 7 días antes de la cosecha. Máximo dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DERRIBE 50 EC® es compatible con la mayoría de insecticidas y plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

