

RANDOSATO®

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Glyphosate, en forma de sal isopropilamina.....	480 g/L
Aditivos	c.s.p 1 L



Agropecuaria Chimú
...un compromiso con el agro

Agropecuaria Chimú
...un compromiso con el agro

Contenido neto : 200 L

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMMABLE

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No transportar con conjuntos de protección ni bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Fosfometil glicina**
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está conciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.: + 51-1-222-2795

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RANDOSATO® 480 SL es un herbicida, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha gramíneas, tanto anuales como perennes, actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Piaga		Dosis		PC (días)	LM (pp)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
ESPÁRRAGO	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>				
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>				
	Gramma dulce	<i>Cynodon dactylon</i>				
	Cadillo	<i>Centotheca echinatus</i>				
	Verdugo	<i>Amaranthus dubius</i>				
	Moco de pavo	<i>Portulaca oleracea</i>	-	2.0	5	0.
	Amor seco	<i>Echinochloa colonum</i>				
	Capulí	<i>Bidens pilosa</i>				
	Rabo de zorro	<i>Nicotiana glauca</i>				
MANGO	Pata de gallina	<i>Elettaria indica</i>				
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
	Rabo de zorro	<i>Setaria sp.p.</i>	2.0	3.2	N.D.	0.
	Coquito o grama dulce	<i>Cyperus rotundus</i>				
PALTO	Pata de gallina	<i>Elettaria indica</i>				
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
	Rabo de zorro	<i>Setaria sp.p.</i>	2.0	2.8	N.D.	0.
	Coquito o grama dulce	<i>Cyperus rotundus</i>				
CAÑA DE AZÚCAR	Gramma	<i>Leptochloa univirens</i>				
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>				
	Rabo de zorro	<i>Setaria sp.p.</i>				
	Coquito o grama dulce	<i>Cyperus rotundus</i>	2.0	3.4	N.D.	2.0

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

RANDOSATO® 480 SL debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliarmente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERÍODO DE REINGRESO

PERIODO DE REINGRESO
Reingresar al campo después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Compatible con otros herbicidas pre emergentes.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

