"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- No comer beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Dinitroanilinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte
- Antídoto: No tienen antídoto específico
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; CICOTOX: (01) 328- 7700; ADAMA AGRICULTURE PERÚ S.A.: (01)641-0000**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para plantas acuáticas y semi-acuaticas
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Gandul®

400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
Pendimethalin .....400 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 2683 -SENASA

Titular de Registro:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254, Of. N° 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

ADAMA

Formulado por:
ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia.
Calle 1C N° 7-53 Int Zona Franca Barranquilla, Colombia.

Importado y Distribuido por:
AGRO KLINGE S.A.
Av. El Derby N° 254, Of. N° 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.

AgroKlinge a member of ADAMA

Contenido Neto: **20 Litros**
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Gandul 400 EC es un herbicida pre-emergente recomendado para el control de malezas anuales de hoja ancha y angosta que se absorbe por las raíces y brotes. Las plántulas emergidas presentan síntomas similares a deficiencia nutricional (enrojecimiento) o de sequia debido al pobre desarrollo del sistema radicular. La pendimethalin actúa inhibiendo la mitosis y división celular en la planta.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Científico	Nombre común			
ALCACHOFA	Amor seco	*Bidens pilosa*	2-3	90	0.1
	Yuyo	*Amaranthus hybridus*			
	Hierba mora	*Solanum nigrum*			
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			
	Capuli cimarrón	*Nicandra physalodes*			
	Pata de gallina	*Eleusine indica*			
	Pega pega	*Setaria verticillata*			
ARROZ	Amor seco	*Bidens pilosa*	3.0-3.5	180	0.1
	Campanilla	*Convolvulus arvensis*			
	Grama dulce	*Cynodon dactilon*			
	Malva	*Malvastrum coromandelianum*			
CEBOLLA	Amor seco	*Bidens pilosa*	2.5-3.0	60	0.1
	Yuyo	*Amaranthus hybridus*			
	Hierba mora	*Solanum nigrum*			
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			
	Malva	*Malvastrum coromandelianum*			
	Hierba de gallinazo	*Chenopodium ambrosioides*			
	Pega pega	*Setaria verticillata*			
ESPÁRRAGO	Amor seco	*Bidens pilosa*	2.0	14	0.15
	Yuyo	*Amaranthus hybridus*			
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*			
	Chamico	*Datura stramonium*			
	Pata de gallina	*Eleusine indica*			
	Hierba de gallinazo	*Chenopodium murale*			
	Pega pega	*Setaria verticillata*			
PIMIENTO	Capuli cimarrón	*Nicandra physalodes*	2.0	70	0.1
	Yuyo	*Amaranthus hybridus*			
	Amor seco	*Bidens pilosa*			
	Pega pega	*Setaria verticillata*			

P.C.: Periodo de carencia LMR: Límite Maximo de Residuos (en partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN,
Número máximo de aplicaciones por campaña-año: 1.
Alcachofa: Realizar la aplicación en pre-emergencia de las malezas, 1 a 2 días antes del transplante.
Arroz: Realizar la aplicación en pre-emergencia de las malezas, luego de la germinación del cultivo (10 -12 días después de la siembra).
Cebolla: Aplicar en pre-emergencia de las malezas luego del transplante del cultivo.
Espárrago: Aplicar en pre-emergencia de las malezas, antes del transplante del cultivo o a término de la cosecha.
Pimiento: Aplicar antes del transplante, o después de los 7 a 10 días del cambio de surco sobre la línea de riego.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
El pendimethalin es compatible con otros herbicidas residuales como metribuzina, atrazina y oxyfluorfen, sin embargo se recomienda bajo responsabilidad del usuario, realizar pruebas previas a pequeña escala para determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar. No es compatible con sustancias alcalinas.

FITOTOXICIDAD
Gandul 400 EC aplicado bajo las condiciones y dosis recomendadas no presenta riesgo de fitotoxicidad al cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Dimensiones: 330 mm x 200 mm