

SI-KARIO 75.7

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Gránulos solubles (SG)

Composición:

Glyphosate ammonium salt757 g/kg

Aditivos c.s.p. 1 kg

PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

L&M Servicios Agrícolas Integrales SAC
Av. República de Panamá 3418 Oficina 301.
Torre Barlovento. San Isidro. Lima, Perú.
Teléfono: (511) 382-4874.
seragro@seragro.net. www.seragro.net

FORMULADOR:

Sichuan Leshan Fuhua Tongda Agro-Chemical
Technology Co Ltd.
Qiaogou Town, Wutonqiao District Leshan,
Sichuan, China. 614800
Tel: 0086-833-3352686. Fax: 0086-833-3352686

IMPORTADOR:

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY SAC
RUC: 20603903359
Calle Virrey Manuel Amat y Juniet N° 502 Of. 101
Urb. La Virreyna Surco - Lima
Teléfono: 01-3634668
www.silvestreshanghai.com



DISTRIBUIDOR:

PERÚ FÉRTIL EIRL
RUC: 20600039424
Jirón Neón 5681 Zona Industrial Infantas
Los Olivos Lima.



Lote N°:

Contenido Neto: 1 Kg

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: derivado de la glicina

- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrole la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13040
ESSALUD: 0801-10200
L&M Servicios Agrícolas Integrales S.A.C.: 01- 382-4874

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 05 metros
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

GENERALIDADES

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SI-KARIO 75.7 con ingrediente activo Glyphosate es un herbicida sistémico de amplio espectro (no selectivo). **SI-KARIO 75.7** puede controlar malezas anuales y perennes mediante la inhibición de la síntesis de aminoácidos aromáticos necesarios para la formación de proteínas en las plantas susceptibles.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo (02) aplicaciones por campaña con intervalos de 21 días para el cultivo objetivo. Por ningún motivo podrá realizar 03 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Efectuar pruebas de compatibilidad. Evitar recipientes de cobre, acero galvanizado, acero dulce, hierro y latón.

FITOTOXICIDAD

SI-KARIO 75.7 no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las dosis e indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	MALEZA		DOSIS Kg/200L	Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Coquito Pata de gallina Pega-peg Verdolaga Yuyo	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus dubius</i>	1.5 - 2.0	14	0.50

LMR = Límite máximo de residuos

