

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No aplique el producto en presencia de vientos fuertes o en las horas de mayor frecuencia.
- Manténgase alejado del calor y flama abierta.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroides
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No provoque el vómito.
 - En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si hay irritación y persiste consultar con un médico.
 - En caso de intoxicación no provoque vómito. Acuda al médico a la brevedad posible.
- Antídoto:** Si se ingiere hacer lavados gástricos y con mucho cuidado. Un catártico salino (Sulfato de Magnesio) 15 a 30 gramos disuelto en gua deberá ser dado. También usar 15 a 20.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN

CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811
ESSALUD: 411-8000 (Anexo 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- Respetar una banda no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:

Zeta - cypermethrin 180 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. N° 311-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

FMC Latinoamerica S.A. Sucursal
Av. Republica de Panamá 3531
Int. 1203, San Isidro - Lima

Formulador:

FMC Corporation
2929 Walnut St. Filadelfia,
PA 19104 - Estados Unidos

Importado y distribuido por:

AGRO KLINGE S.A.

Calle René Descartes 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú. Telf.: 612-6565,
R.U.C No 20508704217



Fec ha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Nº de lote:

Contenido Neto: 200 L



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® Marcas registradas de FMC.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FURIA es un insecticida piretroide sintético. Actúa por ingestión y contacto. Para preparar la mezcla, llenar con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de FURIA recomendado agitando bien y completar luego con más agua.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC.	LM.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/200L	mL/ha		
ALGODÓN	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	250*	250*	7	0,05 - 0,5
PAPA	Mosca Minadora (adulto)	<i>Linomyza huidobrensis</i>	75 - 150	150 - 300	7	0,05
	Gorgojo de los Andes	<i>Prennotypes sp.</i>	200			
	Pulgilla Saltona	<i>Epitrix sp.</i>	200			
AJO	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>		150 - 200	7	0,05
MARIGOLD	Mosca Barrenadora	<i>Melanagromyza sp.</i>	200		7	0,05
MAÍZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150 - 200		7	0,05
	Gusano de Tierra	<i>Agrotis, Feltia y Prodenia</i>	250			
ESPARRAGO	Gusano de Tierra	<i>Agrotis, Feltia y Prodenia</i>	250		7	0,05
FRIJOL	Gusano de Tierra	<i>Agrotis, Feltia y Prodenia</i>	250		7	0,05
ALCACHOFA	Spodoptera	<i>Spodoptera eridania</i>	150 - 200		N.A.	N.A.
	Mosca Minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100 - 150			
CRISÂNTEMO	Pulgón	<i>Aphis gossypii</i>		300	N.A.	N.A.
ROSA	Pulgón	<i>Macrosiphum rosae</i>		300	N.A.	N.A.
PIMIENTO	Gusano defoliador	<i>Spodoptera eridania</i>	150 - 200		N.A.	0,2
CEBOLLA	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	150 - 200		N.A.	0,1
ALMACENAJE DE TUBERCULOS, SEMILLAS V GRANOS ALMACENADOS						
PAPA	Polilla	<i>Pthorimaea operculella</i>	150		Desinfección del almacén antes de depositar los tubérculos. Aplicar antes de envasar.	
FRIJOL	Gorgojo del Frijol	<i>Zabrotes subfasciatus</i>	200			
MAÍZ	Gorgojo del Maiz	<i>Sitophilus oryzae</i>	200			

*Usar bomba a motor;

PC.= Última aplicación a la cosecha en días;

LM.R.= Límite máximo de residuos en p.p.m;

N.A.= No Aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Dependiendo del nivel de infestación de la plaga, las aplicaciones se pueden realizar con una frecuencia de 7 a 10 días.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 Horas.

COMPATIBILIDAD

Furia es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

Furia no representa efectos tóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".