Tamaño de letra: 8 puntos Tamaño de letra: 9.5 puntos Tamaño de letra: 7 puntos

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante aqua v jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No aplique el producto en presencia de vientos fuertes o en las horas de mayor frecuencia
- Manténgase alejado del calor y flama abierta.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si hay irritación v persiste consultar con un médico.
- En caso de intoxicación no provoque vómito. Acuda al médico a la brevedad posible

Antídoto: Si se ingiere hacer lavados gástricos y con mucho cuidado. Un catártico salino (Sulfato de Magnesio) 15 a 30 gramos disuelto en qua deberá ser dado. También usar 15 a 20.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN CISPROQUIM®: 080-050-847

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811 ESSALUD: 411-8000 (Anexo 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



- Peligroso para organismos acuáticos
- · No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases va-
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superciales o en suelos altamente permeable.
- Respetar una banda no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10
- Peligroso para animales doméstico, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:

Aditivos c.s.p 1L

Reg. N° 311-96-AG-SENASA

Titular del Registro:

FMC Latinoamerica S.A. Sucursal

Av. Republica de Panamá 3531 Int. 1203. San Isidro - Lima

Formulador:

FMC Corporation

2929 Walnut St. Filadelfia. PA 19104 - Estados Unidos

Importado y distribuido por: AGRO KLINGE S.A.

- AV. EL DERBY 254 INT. 306 URB. EL DERBY DE MONTERRICO LIMA -LIMA SANTIAGO DE SURCO



Fec ha de Formulación: Fecha de Vencimiento: Nº de lote:

Contenido Neto: 200 L



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marcas registradas de FMC.



MODERADAMENTE PELIGROSO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FURIA es un insecticida piretroide sintético. Actúa por ingestión y contacto. Para preparar la mezcla, llenar con agua el tanque de aplicación hasta la mitad, agregue la cantidad de FURIA recomendado agitando bien y completar

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC.	LM.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/200L	mL/ha	PC.	(ppm)
ALGODÓN	Arrebiatado	Dysdercus peruvianus	250*	250*	7	0,05 - 0,5
PAPA	Mosca Minadora (adulto) Gorgojo de los Andes Pulguilla Saltona	Linomyza huidobrensis Prennotrypes sp. Epifrix sp.	75 - 150 200 200	150 - 300	7	0,05
AJO	Thrips	Thrips tabaci		150 - 200	7	0,05
MARIGOLD	Mosca Barrenadora	Melanagromyza sp.	200		7	0,05
MAÍZ	Cogollero Gusano de Tierra	Spodoptera frugiperda Agrotis, Feltia y Prodenia	150 - 200 250		7	0,05
ESPARRAGO	Gusano de Tierra	Agrotis, Feltia y Prodenia	250		7	0,05
FRIJOL	Gusano de Tierra Cigarrita	Agrotis, Feltia y Prodenia Empoasca sp.	250		7	0,05
ALCACHOFA	Spodoptera Mosca Minadora	Spodoptera eridania Liriomyza huidobrensis	150 - 200 100 - 150		N.A. N.A.	N.A. N.A.
CRISÂNTEMO	Pulgón	Aphis gossypii		300	N.A.	N.A.
ROSA	Pulgón	Macrosiphum rosae		300	N.A.	N.A.
PIMIENTO	Gusano defoliador	Spodoptera eridania	150 - 200		N.A.	0,2
CEBOLLA	Thrips	Thrips tabaci	150 - 200		N.A.	0,1
ALMACENAJE DE TUBERCULOS, SEMILLAS V GRANOS ALMACENADOS						
PAPA	Polilla	Pthorimaea operculella	150	Desinfección del almacén antes de depositar los tubérculos.		
FRIJOL	Gorgojo del Frijol	Zabrotes subfasciatus	200	Aplicar antes de envasar.		
MAÍZ	Gorgojo del Maiz	Sitophilus oryzae	200			

*Usar bomba a motor,

P.C.= Última aplicación a la cosecha en días;

L.M.R.= Límite máximo de residuos en p.p.m;

N.A.= No Aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Dependiendo del nivel de infestación de la plaga, las aplicaciones se pueden realizar con una frecuencia de 7 a

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 Horas.

Furia es compatible con plaquicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina

FITOTOXICIDAD

Pictogramas: 12.5 x 12.5 mm

Furia no representa efectos totóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".















TRIPLE

LAVADO













00000000_ E,FURIA,180EC,200L,E#PE,SF,AGROKLINGE.indd 1

06/11/2020 13:58:09

