

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Manipulación solo por personas adultas y con experiencia en el manejo de estos productos. Manipular con cuidado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Equipo de protección personal a utilizar durante la manipulación: guantes y botas de goma. Durante su aplicación utilizar guantes, protector facial, pechera y botas, que impidan el contacto del producto con la piel.
- Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. No comer, beber o fumar durante su manipulación o aplicación. No inhalar el producto y no exponerse a la neblina de la pulverización. No aplicar contra el viento. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos. Después del uso del producto lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de casa. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lave con abundante agua los equipos utilizados en la aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, provocar el vómito dando de beber 2 o 3 vasos de agua con sal, si la persona está consciente
- En caso de inhalación trasladar al paciente al aire fresco y vigilar su respiración.
- Si entra en contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por un periodo de 15 minutos, tratando de abrir los párpados ocasionalmente.
- Si entra en contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- **En caso de emergencia llamar a:** CETOX telef.: 0800-71911, ESSALUD telef.: 423-7600

NOTA AL MÉDICO

Tratamiento sintomático y de sostén. No tiene antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.

“Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado”

“Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase”

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Respete las dosis y época de aplicación del producto.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.
- No vierta el remanente del producto ni los envases vacíos o agua de lavado del equipo de aplicación en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

VALMITON

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN

Citoquininas	0.132 g/L
Giberelinas	0.050 g/L
Auxinas	0.050 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

Reg RCP N° 082 - SENASA

IMPORTADO POR:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9,
Magdalena del Mar, Lima - Perú



FORMULADO POR:
IQ Chemicals & Labs S.A. de C.V.
Eje 3 N° 329, 2da Sección, Cd Industrial
Xicohténcatl, 90431 Tetla, Tlaxcala - México

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VALMITON es un regulador de crecimiento de plantas a base de citoquininas, giberelinas y auxinas, que al interactuar tienen un efecto positivo en la calidad y cantidad de las cosechas.

Las citoquininas promueven la división celular induciendo a la formación de nuevos brotes en la etapa vegetativa. Las giberelinas influyen en la iniciación floral, promueven la fructificación y crecimiento del fruto. Las auxinas promueven la formación y crecimiento de las raíces.

VALMITON contribuye al balance armónico de las citoquininas, giberelinas y auxinas en la planta.

Preparación y aplicación

VALMITON se prepara diluyendo previamente la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

VALMITON puede ser aplicado mediante cualquier sistema de aspersión terrestre o aérea; procurando realizar la aplicación durante las horas de la mañana y con suficiente humedad.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	DOSIS L/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN	PC (Días)	LMR (ppm)
Arroz	0.4 - 0.5	Aplicar al inicio de macollamiento o en punto de algodón.	*	**

PC: Período de carencia

* No hay restricciones de aplicación antes de la cosecha

** Exento de tolerancia

LMR: Límite máximo de residuo

FRECUENCIA DE ÉPOCA Y APLICACIÓN:

Se recomienda una aplicación por campaña, al inicio del macollamiento o en punto de algodón.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No es compatible con productos de reacción alcalina y ácida. Se recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas e instrucciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

COD.



PRECAUCIÓN

