7.5 x 21 cm

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- El producto causa irritación moderada a los ojos. Evitar el contacto con los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, asi como la inhalación por aspersión de aplicación, gotas o vapores.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Guardar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado. En un lugar fresco y seco.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiese, bañese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada separada de la ropa de casa.
- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No re - envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Manejo y aplicación por personal capacitado.
- No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

En caso de emergencia llamar a **ESSALUD** (linea gratuita): 0801-10200 **ESSALUD** en linea 411- 8000, opción 4: consultoría médica - Cia de Bomberos (Emergencias)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución de mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMIA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

Xipronil® 20 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fipronil .... 200 g/L
aditivos c.s.p... 1 L

Reg. PQUA Nº 366 - SENASA

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702.
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 253-6444

Formulado por:
POINT INTERNATIONAL LTD.
Great Rollright, Chipping Norton, Gran Bretaña
Tel.: (44)1608 730191 Fax: (44) 1608737715

Contenido Neto: 250ml

Lote Nº:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

NO CORROSIVO
NO INFLAMABLE **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

XIPRONIL 20 SC es un insecticida fenilpirazol de acción sistémica y de amplio espectro; que actúa por contacto e ingestión. Presenta un buen efecto residual sobre insectos del suelo y follaje.

XIPRONIL 20 SC se emplea diluido en agua; preparar una pre - mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

XIPRONIL 20 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

CUADRO DE USOS: **"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml/200 L	ml /ha		
Algodón	"Áfido ó pulgón"	*Aphis gossypii*	150-200	300-400	21	0,005
Espárrago	"Caracha" (Mosquilla de los brotes)	*Prodiplosis longifila*	200-250	–	1	0,005
Papa	"Gorgojo de los Andes"	*Premnotrypes suturicallus*	250	–	14	0,01
Pimiento	"Caracha" (Mosquilla de los brotes)	*Prodiplosis longifila*	200	400	21	0,005
Cebolla	"Thrips"	*Thrips tabaci*	200-250	–	15	0,02
Tomate	"Caracha" (Mosquilla de los brotes)	*Prodiplosis longifila*	200-250	–	21	0,005
Arroz	"Mosca minadora del arroz"	*Hydrellia wirthi*	300	300	7	0,01
Sandia	"Barrenador de frutos y guías"	*Diaphania nitidalis*	0.20-0.25	–	3	0,005

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se deberá evaluar la incidencia de la plaga para proceder a la aplicación de **XIPRONIL 20 SC.** También dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra. Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: XIPRONIL 20 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común; sin embargo. se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con los productos a utilizar.

FITOTOXICIDAD: No es fitotoxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Banda Amarilla
Pantone yellow C

LOGO CAISAC
PANTONE 711 C

LOGO CAISAC
PANTONE 2945 C