

TAMBOR DE 20 KILOGRAMOS

SIZE: 14.0 X 28.0 cm

10-02-2021

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice guantes, botas, respirados y ropa de protección para prevenir la exposición durante la preparación y aplicación.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Lactona macrocíclica
- Evite la inhalación y el contacto con los ojos, la piel o heridas abiertas.
- En caso de inhalación retire a la persona del área contaminada hacia una zona de aire fresco. Consegir atención médica de inmediato.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y acudir al médico.
- Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- El producto no tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:

Titular GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO.: +51 (01) 2663828 ó SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para las abejas y otros artrópodos benéficos, evitar la aplicación en época de floración.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

KADONDO-AG®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Abamectin..... 5 g/kg  
Bacillus thuringiensis var. kurstaki..... 15 g/kg  
Aditivos..... csp 1.0 kg

Registro PQUA N° 2711 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Car. Paíta-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paíta - Paíta, Perú . Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937  
info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD.

Room 2105, QD 3102 Trend Centre 29 - 31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China . Teléfono: 0085-229-738324 . info@shanghaiagrynova.com

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paíta-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paíta - Paíta, Perú . Teléfono: 273330, ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com



Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : 20 Kg  
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KADONDO-AG® es un insecticida a base de endotoxinas y esporas de la bacteria Bacillus thuringiensis var. kurstaki, y abamectina las cuales al ser aplicadas sobre diversos cultivos controla estadios larvales de lepidópteros comedores de follaje.

Preparación de la mezcla:

- a-En 3 a 5 litros de agua diluir la dosis requerida de coadyuvante.
- b-En la premezcla (a) diluir la dosis indicada de KADONDO-AG® y agitar muy bien.
- c-Llevar la mezcla (b) hasta el volumen final de aplicación requerido.

Es recomendable usarse todo el producto premezclado antes de las 5 horas siguientes.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cultivo   | Plagas                                    |                       | Dosis        |             | PC | LMR  |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|----|------|
|           | Nombre común                              | Nombre científico     | kg/ha        | kg/200L     |    |      |
| Alcachofa | Gusano cogollero                          | Spodoptera frugiperda | 0.50 - 0.90  | 0.25 - 0.30 | 7  | 0.01 |
| Arándano  | Gusano de la bellota                      | Heliothis virescens   | 0.35 - 0.60  | 0.20 - 0.30 | 3  | 0.01 |
| Arroz     | Gusano cogollero                          | Spodoptera frugiperda | 0.25 - 0.60  | 0.25 - 0.30 | 7  | 0.01 |
|           | Gusano cogollero                          | Spodoptera frugiperda | 0.70 - 0.875 | 0.20 - 0.35 | 7  | 0.01 |
| Espárrago | Gusano de tierra                          | Copitarsia decolora   | 0.625 - 0.9  | 0.25 - 0.30 | 7  | 0.01 |
|           | Gusano perforador grande de la bellota    | Heliothis virescens   | 0.375 - 0.60 | 0.25 - 0.30 | 7  | 0.01 |
| Frijol    | Caballada                                 | Spodoptera eridania   | 0.50 - 0.75  | 0.25 - 0.30 | 3  | 0.01 |
| Granado   | Gusano perforador del ápice de la bellota | Pococera atramentalis | 0.75 - 1.50  | 0.25 - 0.30 | 14 | 0.01 |
| Holantao  | Gusano ejército                           | Spodoptera eridania   | 0.35 - 1.26  | 0.25 - 0.35 | 3  | 0.01 |
| Palto     | Bicho del cesto                           | Oiketicus kirbyi      | -            | 0.20 - 0.30 | 1  | 0.02 |
|           | Gusano medidor                            | Sabulodes aegrotata   | 0.75 - 2.25  | 0.25 - 0.30 | 14 | 0.01 |
| Pimiento  | Gusano de la bellota                      | Heliothis virescens   | 0.25 - 1.2   | 0.20 - 0.30 | 7  | 0.02 |
|           | Gusano cogollero                          | Spodoptera frugiperda | 0.5 - 1.4    | 0.20 - 0.35 | 7  | 0.02 |
| Vid       | Gusano de la vid                          | Pholus ampelophaga    | -            | 0.20 - 0.30 | 28 | 0.01 |

PC: Período de carencia en día

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para el cultivo de espárrago, realizar dos aplicaciones por campaña y al inicio de las infestaciones. Para el cultivo de palto, se recomienda iniciar la aplicación cuando las infestaciones sean leves a moderadas. Aplicar como máximo dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas.

COMPATIBILIDAD

KADONDO-AG® no se debe mezclar con productos alcalinos (productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o con pH alcalino.

FITOTOXICIDAD

No se observan efectos de fitotoxicidad si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.”

