TAMBOR DE 25 KILOGRAMOS

SIZE: 14.0 X 28.0 cm

10-02-2021

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
-No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Utilice guantes, botas, respirados y ropa de protección para prevenir la exposición durante la preparación y aplicación.
-No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
-Grupo químico: Lactona macrocíclica
-Evite la inhalación y el contacto con los ojos, la piel o heridas abiertas.
-En caso de inhalación retire a la persona del área contaminada hacia una zona de aire fresco. Conseguir atención médica de inmediato.
-En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y acudir al médico.
-Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
-El producto no tiene antídoto especifico. Realizar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:
Titular GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO.: +51 (01) 2663828 ó SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depósitela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
-Tóxico para las abejas y otros artrópodos benéficos, evitar la aplicación en época de floración.
-Peligroso para los organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
-El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

KADONDO-AG®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:
Abamectin..... 5 g/kg
Bacillus thuringiensis var. *kurstaki*..... 15 g/kg
Aditivos..... csp 1.0 kg

Registro PQUA N° 2711 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO
Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937
info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:
SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD.
Room 2105, QD 3102 Trend Centre 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China . Teléfono: 00852-29738324 . info@shanghaiagrynova.com

IMPORTADOR:
GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO
Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 14B Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937
info@agrynova.com, www.agrynova.com

DISTRIBUIDOR:
NOVAGRO-AG S.A.C.
Car. Paita-Sullana Km. 3 Mz. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (044) 273330
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 25 Kg
Fecha de Vencimiento :

NovAgro-AG®
Valor e innovación al servicio del agricultor

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
KADONDO-AG® es un insecticida a base de endotoxinas y esporas de la bacteria Bacillus thuringiensis var. kurstaki, y abamectina las cuales al ser aplicadas sobre diversos cultivos controla estadios larvales de lepidopteros comedores de follaje.
Preparación de la mezcla:
a-En 3 a 5 litros de agua diluir la dosis requerida de coadyuvante.
b-En la premezcla (a) diluir la dosis indicada de **KADONDO-AG®** y agitar muy bien.
c-Llevar la mezcla (b) hasta el volumen final de aplicación requerido.
Es recomendable usarse todo el producto premezclado antes de las 5 horas siguientes.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	kg/ha	kg/200L		
Alcachofa	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.50 - 0.90	0.25 - 0.30	7	0.01
Arándano	Gusano de la bellota	*Heliothis virescens*	0.35 - 0.60	0.20 - 0.30	3	0.01
Arroz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.25 - 0.60	0.25 - 0.30	7	0.01
Espárrago	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.70 - 0.875	0.20 - 0.35	7	0.01
	Gusano de tierra	*Copitarsia decolora*	0.625 - 0.9	0.25 - 0.30	7	0.01
	Gusano perforador grande de la bellota	*Heliothis virescens*	0.375 - 0.60	0.25 - 0.30	7	0.01
Frijol	Caballada	*Spodoptera eridania*	0.50 - 0.75	0.25 - 0.30	3	0.01
Granado	Gusano perforador del ápice de la bellota	*Pococera atramentalis*	0.75 - 1.50	0.25 - 0.30	14	0.01
Holantao	Gusano ejército	*Spodoptera eridania*	0.35 - 1.26	0.25 - 0.35	3	0.01
Palto	Bicho del cesto	*Oiketicus kirbyi*	-	0.20 - 0.30	1	0.02
	Gusano medidor	*Sabulodes aegrotata*	0.75 - 2.25	0.25 - 0.30	14	0.01
Pimiento	Gusano de la bellota	*Heliothis virescens*	0.25 - 1.2	0.20 - 0.30	7	0.02
	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.5 - 1.4	0.20 - 0.35	7	0.02
Vid	Gusano de la vid	*Pholus ampelophaga*	-	0.20 - 0.30	28	0.01

PC: Periodo de carencia en día *LMR:* Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Para el cultivo de espárrago, realizar dos aplicaciones por campaña y al inicio de las infestaciones. Para el cultivo de palto, se recomienda iniciar la aplicación cuando las infestaciones sean leves a moderadas. Aplicar como máximo dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO
24 horas.

COMPATIBILIDAD
KADONDO-AG® no se debe mezclar con productos alcalinos (productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o con pH alcalino.

FITOTOXICIDAD
No se observan efectos de fitotoxicidad si se usa de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA