Nemata SC x 1L 28.7 x 15cm Ampliación de uso Vid 15.06.2020

## LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

# PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- NEMATA SC requiere que los operarios que lo manejen y apliquen, usen elementos de seguridad correspondientes al manejo de productos "ligeramente tóxicos" (overol, quantes, gorra, botas de caucho, mascarilla y gafas).

Revise el estado del equipo de aplicación y reemplace los elementos defectuosos. No se exponga, ni respire la neblina y vapores de la aspersión.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

- -No reutilizar la ropa y los equipos sin haber sido lavados y revisados previamente; si cualquier parte del cuerpo entra en contacto con el producto, lávela con abundante agua v jabón.
- NEMATA SC, No debe almacenarse ni transportarse junto con bebidas, alimentos o medicamentos.
- Manténgase bajo control, en su envase original debidamente cerrado.
- -Para periodos de almacenamiento cortos se recomienda almacenar el producto en lugares frescos y secos. Para periodos de almacenamiento mayores a dos semanas, manténgase refrigerado a temperaturas menores de 10 °C.
- El transporte debe garantizar que el producto no permanezca a altas temperaturas.
- Debe protegerse de la incidencia directa de lo rayos solares y altas temperaturas, hasta el momento de la aplicación.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- -En caso de contacto con los ojos: Enjuáguelos con abundante agua limpia durante 10 a 15 minutos.
- -En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua v jabón.
- -En caso de inhalación: Retírese del área para respirar aire fresco.
- -En caso de Ingestión: Busque asistencia médica, no induzca el vómito.

# NOTA AL MÉDICO:

DL50 Oral Aguda > 5000 mg/kg DL50 Dermal Aguda > 5000 mg/kg


-Antídoto: No hay un antídoto específico. Tratar al paciente sintomáticamente.

### TELÉFONO DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0 800 13040

# MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado para este fin. -Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- -Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# Purpureocillium lilacinum

**NEMATICIDA AGRÍCOLA** 

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

# Composición:

Purpureocillium lilacinum, Cepa DSM 15169:	
1x10 <sup>10</sup> Conidias viables por litro de formulación	4%
Aditivos	96%
Reg. PBUA Nº 180 - SENASA	

#### TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: FARMAGRO S A

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos, Lima, PERÚ

Teléfono: 6141500 Fax: 6141517



MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

# FORMULADOR:

LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. Calle 17A N° 68 - D, Bogotá -



Contenido Neto: 1L Fecha de Formulación: Fecha de Venimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

#### FORMA DE USO:

Modo de acción: Nemata SC Actúa por contacto con el nematodo. Las conidias de Purpureocillium lilacinum parásitan los huevos y las hembras de los nematodos a través de la producción de enzimas líticas, causando de esta forma la destrucción de los ovarios de las hembras y la reducción de la eclosión de los huevos. Purpureocillium lilacinum puede también producir toxinas que afectan el sistema nervioso y causan deformación del estilete de los nematodos. Ambos efectos pueden producirse simultáneamente y reducir sensiblemente los niveles poblacionales de los nematodos. La aplicación debe hacerse dirigida hacia donde se ubica la plaga y hacia las áreas de desplazamiento de la misma. Puede aplicarse por aspersión, en drench o por invección. según el caso. Consulte al técnico. Momento de aplicación: Nemata SC debe aplicarse siempre al inicio de la infestación, a la aparición de primeros estadios de la plaga y en estadios expuestos al contacto con el producto. Para aplicaciones mas tardías, aumente la frecuencia de aplicación teniendo siempre en cuenta que la plaga debe estar expuesta al contacto con el producto.

### Sistemas de preparación y aplicación:

Preparación de la Mezcla: Coloque primero parte del volumen de agua y luego agreque el producto en la medida correspondiente a la aplicación que vaya a realizar. Enjuague los recipientes que se hayan untado de producto, vertiendo el enjuague sobre la mezcla a aplicar. Mezcle muy bien. Agregue el agua restante para ajustar la dosis correcta. Agite de nuevo la mezcla total hasta que quede homogénea. Aplique inmediatamente. No guarde mezcla para ser aplicada mas tarde. Agite periódicamente la mezcla durante la aplicación si esta toma mas de media hora. Enjuague el envase para recuperar la totalidad del producto que queda adherido a las paredes del

Compatibilidad: Consulte la tabla de compatibilidades de Nemata SC con otros insumos agrícolas con el Departamento Técnico de FARMAGRO S.A.

No aplique Nemata SC en mezcla con fungicidas. Se recomienda la mezcla con el producto Ecoterra WG que es un inoculante biológico, que potencia el desarrollo microorganismos benéficos de la rizósfera y favorece el desarrollo radicular.

Fitotoxicidad: Nemata SC no es fitotóxico, ni fitopatógeno a los cultivos recomendados.

# CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	LMR
	Nombre comúi	Nombre científico	(L/ha)	(días)	(ppm)
Alcachofa	Nematodo del nudo de la raíz	Meloidogyne incognita	0.25 - 0.50	N.A	N.A
Vid	Nematodo del nudo de la raíz	Meloidogyne incognita	0.50	N.A	N.A

PC: Periodo de carencia LMR: Limite máximo de residuos N.A: no aplica

# Responsabilidad civil:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



















