

# PHYTOMOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

POLVO MOJABLE - WP

**Composición:**

Mancozeb.....640 g/kg  
Cymoxanil.....80 g/kg  
Aditivos.....csp1 kg

**Reg. PQUA N° 2436 - SENASA**

Titular del Registro y Distribuidor:



**Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Calle Rene Descartes N° 311,  
Urb. Santa Raquel 2<sup>da</sup> Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348 -1020  
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:

**M/S Coromandel International Limited**  
"Coromandel House" 1-2-10, Sardar Patel Road  
Secunderabad-500 003, Telangana State,  
India. Telf.: +914027842034

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**Contenido  
Neto: 1 Kg**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



Pantone 498 C



Pantone Reflex Blue C



Pantone 7483 C



Pantone 293 C

30 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Cuidado evite el contacto. PROBABLE CARCINÓGENO.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Acetamida + Dithiocarbamato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle una copia de esta etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.

**Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 411-8000 op. 4, TQC S.A.: (01) 6126565

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases, una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**PHYTOMOR** es un fungicida de contacto y sistémico, con acción preventiva y curativa para el control de enfermedades producidas por patógenos de la orden peronosporales, tales como la "Rancha".

**SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN:**

**PHYTOMOR** se aplica en pulverizaciones foliares, previa mezcla con agua con equipos de aspersión terrestre.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/cil. 200 L		Mancozeb	Cymoxanil
PAPA	"Rancha"	<i>Phytophthora infestans</i>	1-2	0,5-1	14	0,3	0,05

P.C.= Período de carencia / L.M.R.= Límite máximo de residuos

**VOLUMEN DE GASTO DE AGUA:** 400 a 600 L/ha

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El intervalo de aplicación varía entre 7 a 14 días.

**NÚMERO DE APLICACIONES:** 2 aplicaciones/campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada antes de las 24 horas.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina y los compuestos a base de cobre. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."

© Marca Registrada



15 cm