

30.2 cm

PHYTOMOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Mancozeb.....640 g/kg

Cymoxanil.....80 g/kg

Aditivos.....csp1 kg

Reg. PQUA N° 2436 - SENASA



Titular del Registro e Importador:

Tecnología Química y Comercio S.A.

Calle Rene Descartes N° 311,

Urb. Santa Raquel 2^{da} Etapa, Ate. Lima - Perú.

Telf.: 612-6565, Fax: 348 -1020

R.U.C N° 20307150981

Distribuido por:



TALEX PERU S.A.C.

Calle René Descartes N° 311

Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.

Telf.: 612-6565

R.U.C. N° 20513013826

Formulado por:

M/S Coromandel International Limited

"Coromandel House" 1-2-10, Sardar Patel Road

Secunderabad-500 003, Telangana State,

India. Telf.: +914027842034

Lote N°:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

Contenido

Neto: 1 Kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

22.2 cm



Pantone 498 C



Pantone Reflex Blue C



Pantone 7483 C



Pantone 293 C

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Cuidado evite el contacto. PROBABLE CARCINÓGENO.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Acetamida + Ditiocarbamato.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrole una copia de esta etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.

Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398,
ESSALUD: 411-8000 op. 4, TQC S.A.: (01) 6126565

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases, una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PHYTOMOR es un fungicida de contacto y sistémico, con acción preventiva y curativa para el control de enfermedades producidas por patógenos de la orden peronosporales, tales como la “Rancha”.

SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN: PHYTMOR se aplica en pulverizaciones foliares, previa mezcla con agua con equipos de aspersión terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/cil. 200 L		Mancozeb	Cymoxanil
PAPA	"Rancha"	<i>Phytophthora infestans</i>	1-2	0.5-1	14	0,3	0,05

P.C. = Período de carencia / L.M.R. = Límite máximo de residuos

VOLUMEN DE GASTO DE AGUA: 400 a 600 L/ha

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El intervalo de aplicación varía entre 7 a 14 días.

NÚMERO DE APLICACIONES: 2 aplicaciones/campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina y los compuestos a base de cobre. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas."

® Marca Registrada



22.2 cm