

MALINO 880 SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS SOLUBLES (SG)

COMPOSICIÓN:

Glyphosate 880 g/kg
Aditivos..... csp 1 kg

Reg. PQUA N° 2715 - SENASA

Titular del Registro: ADVANGROW AGROSCIENCE PERU S.A.C.
Av. Emilio Cavenecia 225 Of. 409,
San Isidro, Lima - Perú
Teléfono +51 983275666

Importador y Distribuidor:
Nexxt S.A.C.
Av. Mariscal Eloy Ureta Nro. 156
Urb. El Pino (Piso 1 y 3), San Luis,
Lima - Perú
Tel. +51 326-1910 / www.nexxtperu.com

Formulador:
Qingdao Agro-unitek Crop Science Co. Ltd
Room 304, Haier Road No. 63, Qingdao City,
Shandong, China
Tel: +86 5328099555 Fax: +86 53280995916

LOTE N°
FECHA DE FAB.
FECHA DE VCTO.

CONTENIDO NETO: 1 Kg

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Cuidado, evite el contacto. PROBABLE CARCINOGENO.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa con abundante agua y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico Fosfometililicida.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente o lleve al paciente al médico. Lea la etiqueta.
- En caso de ingestión, inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén lentamente retirados si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: (01) 326-7700
ESSALUD: 411-8000, opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido de este envase inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligros para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar en zonas con napa freática superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MALINO 880 SG Es un herbicida sistémico, no selectivo usado para el control post-emergente de las malezas gramíneas, ciperáceas y de hojas anchas anuales y perennes en el cultivo de espárragos.

MALINO 880 SG se prepara diluyendo la dosis indicada en recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Para pulverizaciones al follaje con mochila.

*** CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO ***

Cultivo	Malezas		Dosis kg/cil	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	1.0	5	0.5
	Gramma china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Capull cimarrón	<i>Nicantra physalodes</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			

PC: Periodo de Carencia LMR: Limite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar **MALINO 880 SG** una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: MALINO 880 SG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, excepto con aquellos de naturaleza muy ácida.

FITOTOXICIDAD: El producto no causa fitotoxicidad si es usado en el cultivo recomendado y dosis señaladas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

