



Requiem Prime

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

Concentrado emulsionable (EC)

Composición:
Mezcla de Terpenos, 152.3 g/L Aditivos, csp 1 L
Reg. N° 014-SENASA-PBA-EV

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10, San Isidro

Formulado por:
Bayer CropScience srl
Via delle Industrie, 9
24040 Filago (BG)
Italia

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima - Perú, Telf. 211-3800

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO
INFLAMABLE



Lote N°
Fecha de
Formulación:
Fecha de
Vencimiento:

Contenido Neto: 0.5 L
®=Marca Registrada del grupo Bayer

PRECAUCIÓN

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Terpenoides.
- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Teléfonos de emergencia: Llamar a ESSALUD: 411 8000 anexo 4, Infosalud: 0800-10-828, BAYER S.A. 211 3800.
- CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700, CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No aplicar en época de floración del cultivo, ni en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- REQUIEM PRIME es un extracto vegetal que posee una mezcla de tres terpenoides que confieren su capacidad insecticida-acaricida. Actúa por contacto, a través de la degradación de la cutícula suave del insecto, alterando su movilidad y respiración.
- Realice las aplicaciones al detectar las primeras infestaciones, no aplicar en caso de riesgo de lluvia o volver a aplicar si la lluvia ocurre una hora después de la aplicación.
- Método de aplicación: aspersión foliar, con equipos terrestres como pulverizadores manuales, a motor o tractor. Usar equipos de aplicación que realicen una aspersión homogénea, evitando gotas gruesas que se acumulen en la base de la fruta. Antes de aplicar REQUIEM PRIME, agítense bien el envase que lo contiene. Mezcle la cantidad adecuada del producto con agua limpia hasta que quede completa la suspensión. No almacenar el preparado de un día para otro. Evitar aplicaciones a nivel de escurrimiento que pudieran afectar las ceras naturales de las frutas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC* días	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	l/ha	%		
MANDARINA	Pulgón	<i>Aphis spiraecola</i>	5	0.5	N.A	N.A
	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	7.5 -10			
PALTO	Araña marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	6	0.5	N.A	N.A
ARÁNDANOS	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	2 - 4	0.5	N.A	N.A
VID	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	5 -7.5	0.375 - 0.5	N.A	N.A
	Chanchito blanco	<i>Planococcus citri</i>	5 -7.5	0.375 - 0.5	N.A	N.A

PC* = Período de carencia LMR** = Límite máximo de residuos N.A = No aplica
En el cultivo de vid se considera un gasto de agua de 1500 l/ha.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:

Las aplicaciones deben realizarse al inicio de la infestación con poblaciones bajas, por lo que se recomienda evaluar permanentemente el cultivo para determinar el momento adecuado de aplicación. Se recomienda de 2 a 3 aplicaciones por campaña a un intervalo de aplicación de 5 a 10 días. Debido a su acción por contacto, se requiere una buena cobertura en el momento de la aplicación. La aplicación para chanchito blanco debe ir dirigida a la población de ninfas.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas

COMPATIBILIDAD:

Aplicar el producto solo, no en mezcla con otros productos ni con coadyuvantes o aceites.

FITOTOXICIDAD:

En los cultivos recomendados siempre realizar pruebas de fitocompatibilidad ya que cada variedad puede reaccionar de manera diferente.

No aplicar productos a base de Fluopyram, Captan o strobilurinas si no han transcurrido al menos 7 días antes o después de haber aplicado Requiem Prime.

En vid y arándanos: Evitar aplicaciones desde el cambio de color de la fruta en adelante ya que pueden generar manchado de las bayas en algunas variedades. En vid se recomienda aplicar Requiem Prime hasta la etapa de cierre de racimo.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

