

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Ligeramente peligroso por la vía oral y dermal, no exponerse directamente al producto, usar equipo de protección a la piel.
- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente irritable al tracto respiratorio, usar equipo de protección respiratoria.
- Ligeramente irritante a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese. Lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Manténgase alejado del calor y del fuego.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico: Phenoxyquinolina.**
- En caso de intoxicación por ingestión, llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa.
- En caso de intoxicación por inhalación, mover a la persona al aire libre. Si respira con dificultad, suminístrese oxígeno o respiración artificial.
- En caso de contacto con los ojos, lavarse con abundante agua durante 15 minutos, en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito. Se recomienda dar al paciente 30 ml de sulfato de magnesio oralmente, vea a un médico inmediatamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

**SAMU: 106 / SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA.,
SUCURSAL PERU: 444-3096 / CICOTOX: (511) 619-7000 IP 4836 - 4837,
Línea directa: 956740869**

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del productor.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Fortress™

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICION:

Quinoxifen 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 801-SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO**

POR:
SUMMIT AGRO SOUTH
AMERICA SPA, SUCURSAL
PERÚ
Calle Coronel Andrés Reyes
360 Of. 401-A San Isidro.
Lima - Perú
Telf.: (511) 444-3096

FORMULADO POR:

Dow AgroSciences Limited
Estuary Road
King's Lynn
Norfolk PE30 2JD
Inglaterra

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

®™ Marca de the Dow Chemical Company ("DO") o una compañía afiliada a Dow

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Fortress™, es un fungicida de acción preventiva, formulado a base de Quinoxifen, del grupo de las phenoxyquinolinas.

Fortress™ impide el ingreso del patógeno interfiriendo en las señales iniciales de infección, este modo de acción no es compartido con otros fungicidas, no existe resistencia cruzada entre **Fortress™** y otros grupos químicos.

Liénesse el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el **Fortress™** agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese **Fortress™** en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Pimiento	Oídio	<i>Leveillula taurica</i>	0.3	3	1
Vid	Oídio	<i>Erysiphe necator</i>	0.3	14	2
Alcachofa	Oídio	<i>Leveillula taurica</i>	0.3	3	0.3

PC: Período de Carencia LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda no realizar mas de 2 aplicaciones/campaña/año. El intervalo de aplicación es de 14 días.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD:

Fortress™ es compatible con la mayoría de plaguicidas, reguladores de crecimiento, micronutrientes y coadyuvantes agrícolas. No mezclar con materiales oxidantes, básicos ó ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones aquí dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

