

11,0 ± 0,5

16,0 ± 0,5

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**POLYBIO®**  
**50 SG**

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

Composición:

Polyoxin B ..... 500 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. N° 104-SENASA-PBA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEOAGRUM S.A.C.

**neoagrum**

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla  
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 100 g

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:

ZHEJIANG MEDICINES AND HEALTH  
PRODUCTS IMP. & EXP. CO., LTD.  
ZMC building, 101-2 N.zhongshan road,  
Hangzhou 310003. China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**PRECAUCIÓN**

Medidas en cms.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es tóxico si se ingiere o inhala.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y nunca en horas de alta temperatura.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Realice la aplicación, siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

SAMU: 106 NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: POLYBIO® 50 SG**

es un fungicida sistémico que inhibe la biosíntesis de la quitina de la pared celular de los hongos, evitando la germinación y esporulación de las esporas, así como el crecimiento del tubo germinativo, deteniendo la expansión de lesiones. Por ser sistémico es absorbido por hojas, tallos y raíces de la planta.  
De acuerdo con la clasificación del FRAC (Fungicida Resistante Action Committee), el producto POLYBIO® 50 SG forma parte del grupo 19.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una solución uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con equipos convencionales de aspersión foliar.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar POLYBIO 50 SG al observar los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo del patógeno. Para el cultivo de vid y arándano, realizar de 2 a 3 aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año. No aplicar a una temperatura mayor a 30°C, ni a una humedad relativa menor a 50%.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Puede reingresar al campo 12 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD:** POLYBIO® 50 SG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con sustancias ácidas y sustancias alcalinas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiera mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS kg/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.10 - 0.15	N.A.	N.A.
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0,04	N.A.	N.A.

P.C.: Periodo de carencia

N.A.: No Aplica

L.M.R.: Limite máximo de residuos



Etiqueta adhesiva