

13,0 ± 0,5

19,0 ± 0,5

2.85

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

POLYBIO®
50 SG

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

Composición:

Polyoxin B 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. N° 104-SENASA-PBA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neoagrum

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 500 g

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
ZHEJIANG MEDICINES AND HEALTH
PRODUCTS IMP. & EXP. CO., LTD.
ZMC building, 101-2 N.zhongshan road,
Hangzhou 310003. China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

Medidas en cms.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere o inhala.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y nunca en horas de alta temperatura.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Realice la aplicación, siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasládela a un ambiente ventilado.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: POLYBIO® 50 SG es un fungicida sistémico que inhibe la biosíntesis de la quitina de la pared celular de los hongos, evitando la germinación y esporulación de las esporas, así como el crecimiento del tubo germinativo, deteniendo la expansión de lesiones. Por ser sistémico es absorbido por hojas, tallos y raíces de la planta. De acuerdo con la clasificación del FRAC (Fungicide Resistant Action Committee), el producto POLYBIO® 50 SG forma parte del grupo 19. Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una solución uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con equipos convencionales de aspersión foliar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar POLYBIO® 50 SG al observar los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo del patógeno. Para el cultivo de vid y arándano, realizar de 2 a 3 aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año. No aplicar a una temperatura mayor a 30°C, ni a una humedad relativa menor a 50%.

PERÍODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 12 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: POLYBIO® 50 SG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con sustancias ácidas y sustancias alcalinas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS kg/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.10 – 0.15	N.A.	N.A.
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.04	N.A.	N.A.

P.C.: Período de carencia

N.A.: No Aplica

L.M.R.: Límite máximo de residuos



Etiqueta adhesiva