18,0 ± 0,5

26,0 ± 0.5

3.9

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

POLYBIO® 50 SG

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

Composición:
Polyoxin B ..... 500 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. N° 104-SENASA-PBA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neoagrum

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 1 kg
Nº de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
ZHEJIANG MEDICINES AND HEALTH PRODUCTS IMP. & EXP. CO., LTD.
ZMC building, 101-2 N.zhongshan road,
Hangzhou 310003. China.

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

PRECAUCIÓN

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es tóxico si se ingiere o inhala.
- Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento y nunca en horas de alta temperatura.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Realice la aplicación, siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 **NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depósitela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: POLYBIO® 50 SG es un fungicida sistémico que inhibe la biosíntesis de la quitina de la pared celular de los hongos, evitando la germinación y esporulación de las esporas, así como el crecimiento del tubo germinativo, deteniendo la expansión de lesiones. Por ser sistémico es absorbido por hojas, tallos y raíces de la planta.
De acuerdo con la clasificación del FRAC (Fungicide Resistante Action Committee), el producto **POLYBIO® 50 SG** forma parte del grupo 19.
Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una solución uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con equipos convencionales de aspersión foliar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar **POLYBIO® 50 SG** al observar los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo del patógeno. Para el cultivo de vid y arándano, realizar de 2 a 3 aplicaciones por campaña, considerando una campaña por año.
No aplicar a una temperatura mayor a 30°C, ni a una humedad relativa menor a 50%.

PERÍODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 12 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: POLYBIO® 50 SG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con sustancias ácidas y sustancias alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/200L	(días)	(ppm)
Arándano	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	0.10 – 0.15	N.A.	N.A.
Vid	Oidium	*Erysiphe necator*	0.04	N.A.	N.A.

P.C.: Periodo de carencia N.A.: No Aplica L.M.R.: Límite máximo de residuos

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

Medidas en cms.

Etiqueta adhesiva