



LEA EST A HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTENGASE BAJO CLAVE

WOLFRINE 50 WG se utiliza para el control de las larvas de la polipodipos y otros moluscos de la zona. Se aplica principalmente por inyección y contacto directo, además tiene un efecto preventivo. Se aplica bien y luego se completa con agua hasta obtener el 1/3 del volumen de agua. La dosis recomendada es de 0.1 mg por litro de agua.

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TECNICO	PLAGA	
			DOSIS Kg/Ha	P.C. (dias) L.M.R. (ppm)
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	30
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	7

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:

Aplicar **WOLVERINE 50 WG** (i.a. Emamectin benzoato) hasta tres aplicaciones en las plantas del campo, campaña como máximo con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, considerando 2 campañas por año para los cultivos de sembrado y plantío.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las atomizadora o equipo con enganche de 3 puntos en tractor.

COMPATIBILIDAD: WOLVERINE 50 WG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase correspondan a las anotadas en la ficha técnica.

Formulado por:
NORCHEM JIANGSU CORPORATION
West Tower, Fortune International Building
Importado y Distribuido por:

Ca. Fray Martín de Munda N° 150, Int. N° 301,
Urb. Naranjo, San Miguel - Lima

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO



LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, tratada durante las primeras 24 horas.

- Realizzare la pubblicazione di un'edizione del volume.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al

indique un profesional de la salud.

- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco

- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040

ESSALUD: 117 (gratuito) CISPROMQUIM: 0800-50847

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo
destinado por las autoridades locales para este fin.

-Tóxicos para abejas y otros polinizadores benéficos

-No aplicar en época de floración.

- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos

alrededores.

-Aplicar temprano en las mañanas o muy por las tardes. Evitar la deriva por el viento.

-Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas

-Tóxico para organismos acuáticos.

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

metros.

animales en el área tratada.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por

las autoridades locales para la im.