

TAMAÑO DE LA ETIQUETA 44 x 16.5 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia, fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia llamar al 3287398 CICOTOX - INFOSALUD 0800-10-828.

Nota al médico:

Pyrimetha® 25 EC no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para peces y abejas.
- Peligroso para animales de sangre caliente.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos de 5 metros.

Pyrimetha® 25 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Cipermetrina 250 g/l
Aditivos 750 g/l

Registro N°: 809-98-AG-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

AGRIPAC PERÚ SAC

Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú

Teléfono: 444 - 3663

FORMULADOR:

LABORATORIOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

Llorente de Tibas, 1,5 Km al este del Periódico de La Nación

PO BOX 10288-1000 - Telef: (506) 2471000

San José, Costa Rica



IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

AGRIPAC PERÚ SAC

Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú

Teléfono: 444 - 3663

Contenido Neto: 200 Litros

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:



INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Agitar el envase antes de usar el producto. No aplicar 15 días antes de la cosecha. Se emplea diluido en agua usándose la proporción correspondiente indicada en el cuadro de uso. Aplicar mediante el uso de pulverizadora de espalda accionada a mano o motor, aplicándose al follaje. No guardar la mezcla preparada para usarlo en días posteriores.

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivos	Plagas		Dosis %	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Algodón	“Gusano rosado”	<i>Pectinophora gossypiella</i>	0.120	15	0.5
	“Arrebiatado”	<i>Dysdercus peruvianus</i>	0.120	15	0.5
Papa	“Mosca minadora”	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.125	15	0.05
Frijol	“Barrenador de brotes”	<i>Epinotia aporema</i>	0.125	15	0.05
Cebolla	“Trips”	<i>Thrips tabaci</i>	0.1	15	0.01
Col	“Gusano de la hoja”	<i>Plutella xylostella</i>	0.1	15	1.0
Tomate	“Polilla”	<i>Scrobipalpula absoluta</i>	0.125	15	0.2
Alcachofa	“Gusano barrenador”	<i>Heliothis virescens</i>	0.075 - 0.1	21	0.1
Paprika	“Gusano del fruto”	<i>Spodoptera eridania</i>	0.075 - 0.1	15	10
Espárrago	“Trips”	<i>Thrips tabaci</i>	0.075 - 0.1	21	0.4

PC: Período de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al inicio de la sintomatología de ataque, repetir una segunda aplicación cuando el recuento de insectos lo amerite.

PERÍODO DE REENTRADA (REINGRESO): Se recomienda no ingresar antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con plaguicidas agrícolas de pH básico.

FITOTOXICIDAD: No se ha observado fitotoxicidad sobre los cultivos tratados cuando se emplean las medidas agronómicas adecuadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

