

TAMAÑO DE LA ETIQUETA 44 x 16.5 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- "Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico" y "Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINOGENO"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia, fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia llamar al 3287398 CICOTOX - INFOSALUD 0800-10-828.

Nota al médico:

Pyrimetha® 25 EC no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para peces y abejas.
- Peligroso para animales de sangre caliente.

Pyrimetha® 25 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN :

Cipermetrina 250 g/l
 Aditivos 750 g/l

Registro N°: 809-98-AG-SENASA

TITULAR DE REGISTRO: **AGRIPAC PERÚ SAC**
 Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
 Teléfono: 444 - 3663

FORMULADOR: **M/S TAGROS CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED**
 No 4 Club House Road, Anna Salai, Chennai
 600 002, Tamilnadu. India

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: **AGRIPAC PERÚ SAC**
 Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
 Teléfono: 444 - 3663

Contenido Neto: 200 Litros
Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de Vencimiento:



INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Agitar el envase antes de usar el producto. No aplicar 15 días antes de la cosecha. Se emplea diluido en agua usándose la proporción correspondiente indicada en el cuadro de uso. Aplicar mediante el uso de pulverizadora de espalda accionada a mano o motor, aplicándose al follaje. No guardar la mezcla preparada para usarlo en días posteriores.

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivos	Plagas		Dosis		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	%	L/Ha		
Algodón	“Gusano rosado”	<i>Pectinophora gossypiella</i>	0.125	0.75	N.A.	0.5
	“Arrebiatado”	<i>Dysdercus peruvianus</i>	0.125	0.75	N.A.	0.5
Papa	“Mosca minadora”	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.125	0.5	14	0.05
Frijol	“Barrenador de brotes”	<i>Epinotia aporema</i>	0.125	0.375	14	0.05
Cebolla	“Trips”	<i>Thrips tabaci</i>	0.125	0.437	14	0.01
Col	“Gusano de la hoja”	<i>Plutella xylostella</i>	0.1	0.4	14	1.0
Tomate	“Polilla”	<i>Scrobipalpula absoluta</i>	0.125	0.5	1	0.2

PC: Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al inicio de la sintomatología de ataque, repetir una segunda aplicación cuando el recuento de insectos lo amerite.

PERÍODO DE REENTRADA (REINGRESO): Se recomienda no ingresar antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con plaguicidas agrícolas de pH básico.

FITOTOXICIDAD: No se ha observado fitotoxicidad sobre los cultivos tratados cuando se emplean las medidas agronómicas adecuadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



TAMAÑO DE LA ETIQUETA 31 x 13.5 cm

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- "Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico" y "Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINOGENO"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia, fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia llamar al 3287398 CICOTOX - INFOSALUD 0800-10-828.

Nota al médico:

Pyrimetha® 25 EC no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para peces y abejas.
- Peligroso para animales de sangre caliente.

Pyrimetha® 25 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN :

Cipermetrina 250 g/l
Aditivos 750 g/l

Registro N°: 809-98-AG-SENASA

TITULAR DE REGISTRO: **AGRIPAC PERÚ SAC**
Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: 444 - 3663

FORMULADOR: **M/S TAGROS CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED**
No 4 Club House Road, Anna Salai, Chennai
600 002, Tamilnadu. India

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: **AGRIPAC PERÚ SAC**
Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: 444 - 3663



Contenido Neto: 1 Litro
Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de Vencimiento:



INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Agitar el envase antes de usar el producto. No aplicar 15 días antes de la cosecha. Se emplea diluido en agua usándose la proporción correspondiente indicada en el cuadro de uso. Aplicar mediante el uso de pulverizadora de espalda accionada a mano o motor, aplicándose al follaje. No guardar la mezcla preparada para usarlo en días posteriores.

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivos	Plagas		Dosis		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	%	L/Ha		
Algodón	“Gusano rosado”	<i>Pectinophora gossypiella</i>	0.125	0.75	N.A.	0.5
	“Arrebiatado”	<i>Dysdercus peruvianus</i>	0.125	0.75	N.A.	0.5
Papa	“Mosca minadora”	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.125	0.5	14	0.05
Frijol	“Barrenador de brotes”	<i>Epinotia aporema</i>	0.125	0.375	14	0.05
Cebolla	“Trips”	<i>Thrips tabaci</i>	0.125	0.437	14	0.01
Col	“Gusano de la hoja”	<i>Plutella xylostella</i>	0.1	0.4	14	1.0
Tomate	“Polilla”	<i>Scrobipalpula absoluta</i>	0.125	0.5	1	0.2

PC: Período de Carencia **L.M.R.:** Límite Máximo de Residuos **N.A.:** No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al inicio de la sintomatología de ataque, repetir una segunda aplicación cuando el recuento de insectos lo amerite.

PERÍODO DE REENTRADA (REINGRESO): Se recomienda no ingresar antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con plaguicidas agrícolas de pH básico.

FITOTOXICIDAD: No se ha observado fitotoxicidad sobre los cultivos tratados cuando se emplean las medidas agronómicas adecuadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Tamaño de la etiqueta 26 x 9.5 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”.

"Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico"

"Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINÓGENO"

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta”

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 13040
INFOSALUD 0800-10-828**

Pyrimetha® 25 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Cipermetrina 250 g/l
Aditivo 750 g/l

Registro N°: 809-98-AG-SENASA

TITULAR DE REGISTRO: AGRIPAC PERÚ SAC
Av. José Pardo 223 INT. 41
Miraflores - Perú
Teléfono: 444 - 3663

FORMULADOR: M/S TAGROS CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED
No 4 Club House Road, Anna Salai,
Chennai 600 002, Tamilnadu. India

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: AGRIPAC PERÚ SAC
Av. José Pardo 223 INT. 41
Miraflores - Perú
Teléfono: 444 - 3663



Contenido Neto: 250 ml
Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de Vencimiento:



INFLAMABLE

NO CORROSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

NO EXPLOSIVO

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivos	Plagas		Dosis		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	%	L/Ha		
Algodón	"Gusano rosado"	<i>Pectinophora gossypiella</i>	0.125	0.75	N.A.	0.5
	"Arrebiatado"	<i>Dysdercus peruvianus</i>	0.125	0.75	N.A.	0.5
Papa	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.125	0.5	14	0.05
Frijol	"Barrenador de brotes"	<i>Epinotia aporema</i>	0.125	0.375	14	0.05
Cebolla	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.125	0.437	14	0.01
Col	"Gusano de la hoja"	<i>Plutella xylostella</i>	0.1	0.4	14	1.0
Tomate	"Polilla"	<i>Scrobipalpa absoluta</i>	0.125	0.5	1	0.2

PC: Periodo de Carencia **L.M.R.:** Límite Máximo de Residuos **N.A.:** No aplica

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Tamaño del inserto 14 x 21 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia, fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia llamar al 3287398 CICOTOX - INFOSALUD 0800-10-828.

Nota al médico:

Pyrimetha® 25 EC no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- Agitar el envase antes de usar el producto.
- No aplicar 15 días antes de la cosecha.
- Se emplea diluido en agua usándose la proporción correspondiente indicada en el cuadro de uso.
- Aplicar mediante el uso de pulverizadora de espalda accionada a mano o motor, aplicándose al follaje.
- No guardar la mezcla preparada para usarlo en días posteriores.

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivos	Plagas		Dosis		P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	%	L/Ha		
Algodón	“Gusano rosado”	<i>Pectinophora gossypiella</i>	0.125	0.75	N.A.	0.5
	“Arrebiatado”	<i>Dysdercus peruvianus</i>	0.125	0.75	N.A.	0.5
Papa	“Mosca minadora”	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.125	0.5	14	0.05
Frijol	“Barrenador de brotes”	<i>Epinotia aporema</i>	0.125	0.375	14	0.05
Cebolla	“Trips”	<i>Thrips tabaci</i>	0.125	0.437	14	0.01
Col	“Gusano de la hoja”	<i>Plutella xylostella</i>	0.1	0.4	14	1.0
Tomate	“Polilla”	<i>Scrobipalpula absoluta</i>	0.125	0.5	1	0.2

PC: Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al inicio de la sintomatología de ataque, repetir una segunda aplicación cuando el recuento de insectos lo amerite.

PERÍODO DE REENTRADA (REINGRESO): Se recomienda no ingresar antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con plaguicidas agrícolas de pH básico.

FITOTOXICIDAD: No se ha observado fitotoxicidad sobre los cultivos tratados cuando se emplean las medidas agronómicas adecuadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Tamaño del inserto 14 x 21 cm

Pyrimetha® 25 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN :

Cipermetrina 250 g/l
Aditivos 750 g/l


Registro N°: 809-98-AG-SENASA

Nombre comercial del producto: **Pyrimetha® 25 EC**

Nombre común: Cipermetrina

Clase: Insecticida Agrícola

FÓRMULA ESTRUCTURAL:



FÓRMULA EMPÍRICA: C₂₂H₁₉C₁₂NO₃

PESO MOLECULAR:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Apariencia: Líquido

Color: Marrón

Olor: Aromático

pH: 7.0

Persistencia de espuma: Máximo 4 ml después de 1 minuto

Viscosidad: 1 mm²/s a 20°C

PRESENTACIONES COMERCIALES: 250 ml, 1 y 200 L.

Corrosividad: no corrosivo.

Estabilidad en el almacenamiento : Conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes. Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

“Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico” y “Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINOGENO”

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: “Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco)”. “Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado”. “Mantener el producto alejado de fuentes de calor”. “Nunca transporte los plaguicidas junto con productos.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Peligroso para peces y abejas. Peligroso para animales de sangre caliente.

TITULAR DE REGISTRO:

AGRIPAC PERÚ SAC

Av. JOSÉ PARDO 223 INT. 41 - Miraflores - Perú

Teléfono: 444 - 3663

FORMULADOR:

M/S TAGROS CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED

No 4 Club House Road, Anna Salai, Chennai 600 002, Tamilnadu, India

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

AGRIPAC PERÚ SAC

Av. JOSÉ PARDO 223 INT. 41 - Miraflores - Perú

Teléfono: 444 - 3663

Pyrimetha 25 EC



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO