SIZE: 16.0 x 21.0 cm

# NADABRAHMA-AG

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)**

**COMPOSICIÓN:**

Emamectin Benzoate..... 15 g/Kg
Imidacloprid..... 500 g/Kg
Aditivos ..... c.s.p.1 Kg

**Registro PQUA N° - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**
**GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO**
Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad - Perú
Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937 . info@agrynova.com, www.agrynova.com

**FORMULADOR:**
**SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD.**
Room 2105, QD 3102 Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China . Teléfono: 00852-29738324 . info@shanghaiagrynova.com

**IMPORTADOR:**
**GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO**
Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad - Perú
Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937 . info@agrynova.com, www.agrynova.com

**DISTRIBUIDOR:**
**NOVAGRO-AG S.A.C.**
Car. Paita-Sullana Km. 3 Mza. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (044) 273330
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com

NovAgro-AG®
*Valor e innovación al servicio del agricultor*

N° de Lote :
**Contenido Neto : 0.2 Kg**
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

# SIZE: 16.0 x 21.0 cm

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

-Moderadamente irritante a la piel utilizar con equipo de protección dermal, causa irritación a la piel, enrojecimiento y picazón.

-Evitar el contacto con los ojos y la ropa.

-Puede producir lagrimeo e irritación a los ojos.

-Tóxico por ingestión puede producir vómitos, diarrea, espasmos musculares.

-Moderadamente peligroso por inhalación, causa irritación al tracto respiratorio puede producir tos, irritación nasal, usar equipo de protección respiratorio.

-Dañino si se ingiere.

-Utilice ropa protectora durante la preparación de la mezcla de aplicación y para ingresar en las primeras 24 horas después de aplicado el producto al área tratada.

-No permitir el ingreso de niños, personas en general durante y después de la aplicación al área tratada.

-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

-Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado; alejado de fuentes de calor.

-No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

-Almacenar fuera de la casa-habitación.

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para consumo.

-Aplicar siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

-Grupo químico: Lactonas macrocíclicas y neonicotinoides

-En caso de intoxicación por ingestión lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta. No inducir al vómito no administrar nada si la persona está inconsciente.
-En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 20 minutos. (Retire los lentes de contacto).
-En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar, la piel con abundante agua y jabón durante 30 minutos.
-En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado alejado de la zona tratada, tenerlo en reposo, dar respiración artificial, trasladar a un centro médico inmediatamente.
-Nota al médico: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIAS: CICOTOX: 0800-13040 (GRATUITO)**
**ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4 o CIPROSQUIM: 080-050-847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

-Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.

-No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
-Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes para evitar la deriva por el viento.
-Peligroso para organismos acuáticos.
-No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**NADABRAHMA-AG** es un insecticida que actúa principalmente por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso. Esta compuesto por dos ingredientes activos, Imidacloprid y emamectin benzoato, lo que le da mayor eficacia en el combate de insectos.

**Preparación de la mezcla**

Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.

La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| Cultivo | Plagas | | Dosis | | PC | LMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre | Nombre científico | Kg/Ha | Kg/200L | | |
| Arroz | Mosca minadora del arroz | *Hydrellia wirthi* | 0.375 | 0.25 | 30 | 0.01* 1.5** |
| Cebolla | Trips | *Thrips tabaci* | 0.40 - 0.50 | 0.20 - 0.25 | 21 | 0.01* 0.1** |
| Espárrago | Gusano cogollero | *Spodoptera frugiperda* | 0.45 - 0.75 | 0.15 - 0.25 | 21 | 0.5* 0.05** |
| | Caracha, mosquilla de los brotes | *Prodiplosis longifilia* | 0.225 - 0.875 | 0.15 - 0.25 | 21 | |
| Pimiento | Gusano perforador de la bellota | *Heliothis virescens* | 0.40 - 1.125 | 0.20 - 0.30 | 3 | 0.02* 1.00** |
| | Mosquilla de los brotes | *Prodiplosis longifilia* | 0.30 - 0.9375 | 0.15 - 0.25 | 3 | |

*PC:* Periodo de carencia en días
*LMR:* Límite máximo de residuos en ppm

* Emamectin benzoate
** Imidacloprid

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar hasta 02 aplicaciones por campaña considerando 02 campañas por año, con un intervalo entre aplicaciones de 15 días. Se recomienda usar un pH entre 6 y 7. Se recomienda su aplicación desde la aparición de las primeras infestaciones de las plagas, cuando las larvas aún son pequeñas.

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresar al área tratada después de 24 horas.

**COMPATIBILIDAD**

**NADABRAHMA-AG** es compatible con gran parte de los plaguicidas de uso frecuente sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad física, química y biológica.

**FITOTOXICIDAD**

No se observan efectos de fitotoxicidad de seguirse las recomendaciones.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

*“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones e indicaciones dadas”*