

SIZE: 14.0 x 28.0 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderadamente irritante a la piel utilizar con equipo de protección dermal, causa irritación a la piel, enrojecimiento y picazón.
  - Evitar el contacto con los ojos y la ropa.
  - Puede producir lagrimeo e irritación a los ojos.
  - Tóxico por ingestión puede producir vómitos, diarrea, espasmos musculares.
  - Moderadamente peligroso por inhalación, causa irritación al tracto respiratorio puede producir tos, irritación nasal, usar equipo de protección respiratorio.
  - Dañino si se ingiere.
  - Utilice ropa protectora durante la preparación de la mezcla de aplicación y para ingresar en las primeras 24 horas después de aplicado el producto al área tratada.
  - No permitir el ingreso de niños, personas en general durante y después de la aplicación al área tratada.
  - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
  - Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado; alejado de fuentes de calor.
  - No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
  - Almacenar fuera de la casa-habitación.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para consumo.
  - Aplicar siguiendo la dirección del viento.
- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Lactonas macrocíclicas y neonicotinoides
  - En caso de intoxicación por ingestión lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta. No inducir al vómito no administrar nada si la persona está inconsciente.
  - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 20 minutos. (Retire los lentes de contacto).
  - En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada lavar, la piel con abundante agua y jabón durante 30 minutos.
  - En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado alejado de la zona tratada, tenerlo en reposo, dar respiración artificial, trasladar a un centro médico inmediatamente.
  - Nota al médico: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TÉLEFONOS DE EMERGENCIAS: CICOTOX: 0800-13040 (GRATUITO)**  
**ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4 o CIPROSQUIM: 080-050-847**


MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes para evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

NADABRAHMA-AG



COMPOSICIÓN:

Emamectin Benzoate..... 15 g/Kg  
Imidacloprid..... 500 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p.1 Kg

Registro PQUA N° - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO  
Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad - Perú . Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937  
info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:

SHANGHAI AGRYNOVA CO., LTD.  
Room 2105, QD 3102 Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, China . Telf: 00852-29738324  
info@shanghaiagrynova.com

IMPORTADOR:

AGRIMORPHO S.A.C.  
Mz.3, Lt.8, Dpto. 401, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad - Perú . Teléfono: +51 (044) 273330 . info@isiore.com

DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.  
Car. Paita-Sullana Km. 3 Mza. B Lote 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú . Teléfono: +51 (044) 273330  
ventas@novagro-ag.com, www.novagro-ag.com



N° de Lote :  
Contenido Neto : 20 Kg  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

NADABRAHMA-AG es un insecticida que actúa principalmente por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso. Esta compuesto por dos ingredientes activos, Imidacloprid y emamectin benzoato, lo que le da mayor eficacia en el combate de insectos.

Preparación de la mezcla

Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.

La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cultivo   | Plagas                           |                        | Dosis         |             | PC | LMR            |
|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------|----|----------------|
|           | Nombre                           | Nombre científico      | Kg/Ha         | Kg/200L     |    |                |
| Arroz     | Mosca minadora del arroz         | Hydrellia wirthi       | 0.375         | 0.25        | 30 | 0.01*<br>1.5** |
| Cebolla   | Trips                            | Thrips tabaci          | 0.40 - 0.50   | 0.20 - 0.25 | 21 | 0.01*<br>0.1** |
| Espárrago | Gusano cogollero                 | Spodoptera frugiperda  | 0.45 - 0.75   | 0.15 - 0.25 | 21 | 0.5*           |
|           | Caracha, mosquilla de los brotes | Prodiplosis longifolia | 0.225 - 0.875 | 0.15 - 0.25 | 21 | 0.05**         |
| Pimiento  | Gusano perforador de la bellota  | Heliothis virescens    | 0.40 - 1.125  | 0.20 - 0.30 | 3  | 0.02*          |
|           | Mosquilla de los brotes          | Prodiplosis longifolia | 0.30 - 0.9375 | 0.15 - 0.25 | 3  | 1.00**         |

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Limite máximo de residuos en ppm

\* Emamectin benzoate

\*\* Imidacloprid

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar hasta 02 aplicaciones por campaña considerando 02 campañas por año, con un intervalo entre aplicaciones de 15 días. Se recomienda usar un pH entre 6 y 7. Se recomienda su aplicación desde la aparición de las primeras infestaciones de las plagas, cuando las larvas aún son pequeñas.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

NADABRAHMA-AG es compatible con gran parte de los plaguicidas de uso frecuente sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad física, química y biológica.

FITOTOXICIDAD:

No se observan efectos de fitotoxicidad de seguirse las recomendaciones.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones e indicaciones dadas”



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

