

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# RadiGrow<sup>®</sup> XL

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**COMPOSICIÓN:**

Acido 3 indol butírico (auxina) .....2.84 g/L  
6 benzil amino purina (citoquinina) .....0.02 g/L  
Aditivos.....c.s.p 1L

Reg.RCP N° 086- SENASA

**Titular del registro:**

**DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.**  
Jr. Niquel N° 262, Urb. Infantas  
Los Olivos - Lima 39  
Telf: 544-4397

**Formulado por:**

Innovak Global S.A. de C.V.



Bldv Vicente Lombardo Toledano 10615  
Col. Concordia Chihuahua, Chih.  
México CP. 33750  
Telf.: y Fax (614) 436-0138  
www.innovakglobal.com

**Importado y distribuido por:**



AV. El Derby 254 INT. 306 Urb. El  
Derby de Monterrico, S  
Surco - Lima  
Telf.: 641 - 00

**FECHA DE FORMULACION**

**N° DE LOTE:**

**CONTENIDO NETO: 1 L**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**PRECAUCION**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION"**

- Evite el contacto con los ojos, la piel, puede causar irritación. Dañino si es ingerido.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No exponer a radiación solar.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura, hasta el momento de la aplicación.

**Instrucciones de Primeros Auxilios**

- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona del tratamiento al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con abundante agua y suministre un alcali debil (bicarbonato de sodio). No inducir al vomito si el paciente esta inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Buscar atención médica si persiste irritación.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado inmediatamente. Proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- Antídoto: no existe antídoto específico. Tratar según síntomas.
- Teléfonos de emergencia: SAMU: 104, Desarrollo Técnico Vegetal S.A.C.: 544-4397

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse, después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. No permita animales en las zonas tratadas.
- Si aplica, tome las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **RADIGROW XL** es un regulador de crecimiento de plantas a base de citoquininas tipo 6 benzil amino purina y auxinas tipo ácido 3 indol butírico.
- **Preparación:** requiere condiciones de humedad en suelos próximos a capacidad de campo durante las 24 horas posteriores a su aplicación, para su mayor efectividad.
- **Instrucciones de uso:** Agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad, mida la cantidad a aplicar en recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.
- **Uso:** dirigido a la raíz, se puede aplicar desde la siembra o trasplante hasta en etapas reproductivas a través del sistema de riego por goteo, micro aspersión o por drench dirigido a la base del tallo de la planta.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACION	DOSIS		P.C	L.M.R
		L/Ha	L/200L		
Arándano	Pre brotación/Desarrollo vegetativo	2.0		N.A.	N.A.
Espárrago	Brotación/Desarrollo vegetativo	2.0		N.A.	N.A.
Papa	Siembra/ Emergencia	1.0		N.A.	N.A.
Vid	Cuajado	2.0		N.A.	N.A.
Palto	Crecimiento radicular	3.0		N.A.	N.A.
Piña	Desarrollo radicular		0.5	N.A.	N.A.

N.A. = No Aplica. P.C: Periodo de carencia (días). L.M.R = Límite máximo de residuo en partes por millón (ppm)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar **RADIGROW XL**, para inducir el crecimiento y desarrollo de nuevas raíces en los cultivos de arándano, espárrago, vid y papa.
- En arándano se recomienda realizar 2 aplicaciones cada 20 días, en espárrago 2 aplicaciones cada 30 días, en vid realice una aplicación al momento del cuajado, en papa aplicar a la siembra, en piña realizar 2 aplicaciones: 1ra aplicación, 15 días después del trasplante, 2da aplicación, 15 días después de la primera aplicación (una campaña por año) y en palto realizar 3 aplicaciones por campaña (una campaña por año).

**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con oxidantes fuertes con ninguna reacción violenta y sin humos producidos. Antes de realizar una mezcla, se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** **RADIGROW XL** no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



**ETIQUETA PARA USO EXTERNO**

