

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite el contacto con los ojos, la piel, puede causar irritación. Dañino si es ingerido.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No exponer a radiación solar.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura, hasta el momento de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
 - En caso de ingestión, enjuague la boca con abundante agua y suministre un alcali débil (bicarbonato de sodio). No inducir al vómito si el paciente está inconsciente.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Buscar atención médica si persiste irritación.
 - En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado inmediatamente. Proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- Antídoto: no existe antídoto específico. Tratar según síntomas.
Teléfono de emergencia: SAMU:106, Desarrollo Técnico Vegetal S.A.C.: 544-4397

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse, después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobras del producto. No permita animales en las zonas tratadas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estancias.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

RadiGrow[®] XL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Ácido 3 indol butírico (auxina) 2.84 g/l
 6 Bencil amino purina (citoquinina) 2.2 g/l
 Aditivos 0.96 g/l

Reg. RCP N° 086 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
 Jr. El Maque 1, 282, Urb. Infrata,
 Los Olivos, Lima
 Telf: 544-4397



Innovak Global, S.A. de C.V.
 Blvd. Vicente Lombardo Toledano #6615
 Col. Concordia Chihuahua, Chih. México C.P. 31375
 Tel. (614) 436-0138 Fax (614) 415-4770
www.innovakglobal.com

Importado y Distribuido por:



AGRO KLINGE S.A.
 Av. El Barro 254 Of.306
 Santiago de Surco, Lima
 Tel: (011641)-0000
 R.U.C No. 20508704217

CONTENIDO NETO: 1L

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RADIGROW[®] XL es un regulador de crecimiento de plantas a base de citoquininas tipo 6 benzil amino purina y auxinas tipo ácido 3 indol butírico.
 • Humedad: requiere condiciones de humedad en suelos próximos a capacidad de campo durante las 24 horas posteriores a su aplicación, para su mayor efectividad.

Instrucciones de uso:

Agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad, mida la cantidad a aplicar en recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente, y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y comience el uso de la aspersora.
 Uso dirigido a la raíz, se puede aplicar desde la siembra o trasplante, existen etapas reproductivas a través del sistema de riego por goteo, microaspersión o por riego dirigido a la base del tallo de la planta.

Consulte con un ingeniero agrónomo

CULTIVO	RECOMENDACIÓN	DOSIS		P.C (días)	L.M.R (p.p.m)
		L/ha	L / 200 L		
Arándano	Preparación/ Desarrollo vegetativo	2.0		N.A	N.A
Espárrago	Preparación/ Desarrollo vegetativo	2.0		N.A	N.A
Papa	Siembra/ Emergencia	1.0		N.A	N.A
Vid	Cuajado	2.0		N.A	N.A
Palto	Crecimiento radicular	3.0		N.A	N.A
Piña	Desarrollo radicular		0.5	N.A	N.A

N.A. = No aplica P.C: Periodo de carencia (días) L.M.R.= Limite máximo de residuo en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar **RADIGROW[®] XL**, para inducir el crecimiento y desarrollo de nuevas raíces en los cultivos de arándano, espárrago, vid y papa.
- En arándano se recomienda realizar 2 aplicaciones cada 20 días, en espárrago 2 aplicaciones cada 30 días, en vid realice una aplicación al momento del cuajado, en papa aplicar a la siembra, en piña realizar 2 aplicaciones: 1ra aplicación, 15 días después del trasplante, 2da aplicación, 15 días después de la primera aplicación (una campaña por año) y en palto realizar 3 aplicaciones por campaña (una campaña por año).

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con oxidantes fuertes con ninguna reacción violenta y sin humos producidos. Antes de realizar una mezcla, se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN



ÁREA DE PEGADO