

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION"**

- Evite el contacto con los ojos, la piel, puede causar irritación. Dañino si es ingerido.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No exponer a radiación solar.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura, hasta el momento de la aplicación.

**Instrucciones de Primeros Auxilios**

- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con abundante agua y suministre un alcali débil (bicarbonato de sodio). No inducir al vomito si el paciente este inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Buscar atención médica si persiste irritación.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado inmediatamente. Proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.

Antídoto: no existe antídoto específico. Tratar según síntomas.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, Desarrollo Técnico Vegetal S.A.C.: 544-4397

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. No permita animales en las zonas tratadas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

# RadiGrow XL

REGLADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**COMPOSICIÓN:**

Acido 3 indol butirico (auxina) .....2.84 g/L

6 benzyl amino purina (citoquinina).....0.02 g/L

Aditivos.....c.s.p 1L

Reg.RCP N° 086- SENASA

**Titular del registro:**

**DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C .**

**Jr.Niquel N° 282, Urb. Infantas Los Olivos - Lima 39**

**Telf: 544-4397**

**Formulado por:**



**Bldv Vicente Lombardo Toledano #6615**

**Col. Concordia Chihuahua, Chih.**

**México CP. 31375**

**Telf. y Fax (614) 436-0138**

**www.innovakglobal.com**

**Importado y distribuido por:**



**AGROKLINGE S.A.**

**Av. El Derby 254 Of 303 Santiago de Surco. Lima.**

**Telf: (01)641-0000 / RUC No 20508704217**

**WWW.agroklinge.com.pe**

**FECHA DE FORMULACION:**

**No DE LOTE:**

**CONTENIDO NETO: 1 L**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. No permita animales en las zonas tratadas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- RADIGROW XL es un regulador de crecimiento de plantas a base de citoquininas tipo 6 benzyl amino purina y auxinas tipo ácido 3 indol butírico.
- Instrucciones de uso: Agite el envase, desensaque la tapa y retire el sello de seguridad, mida la cantidad a aplicar en recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.
- Modo de empleo: Uso dirigido a la raíz, se puede aplicar desde la siembra o trasplante hasta en etapas reproductivas a través del sistema de riego por goteo, micro aspersión o por drench dirigido a la base del tallo de la planta.
- Humedad: requiere condiciones de humedad en suelos próximos a capacidad de campo durante las 24 horas posteriores a su aplicación, para su mayor efectividad.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO**

CULTIVO	RECOMENDACIÓN	DOSIS		P.C (días)	L.M.R (p.p.m)
		L/ha	L / 200 L		
Arándano	Pre brotación/ Desarrollo vegetativo	2.0		N.A	N.A
Espárrago	Brotación/ Desarrollo vegetativo	2.0		N.A.	N.A.
Papa	Siembra/ Emergencia	1.0		N.A.	N.A
Vid	Cuajado	2.0		N.A	N.A.
Palto	Crecimiento radicular	3.0		N.A	N.A.
Piña	Desarrollo radicular		0.5	N.A	N.A.
Arroz	Desarrollo radicular		0.5 - 1.0	N.A	N.A.

N.A. = No aplica P.C: Periodo de carencia (días)

L.M.R.= Limite máximo de residuo en partes por millón (ppm)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACION:** En arándano se recomienda realizar 2 aplicaciones cada 20 días, en espárrago 2 aplicaciones cada 30 días, en vid realice una aplicación al momento del cuajado, en papa aplicar a la siembra, en piña realizar 2 aplicaciones: 1ra aplicación, 15 días después del transplante, 2da aplicación, 15 después de la primera aplicación (una campaña por año), en palto realizar 3 aplicaciones por campaña (una campaña por año) y arroz aplicar a los 10 días después del transplante .

**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con oxidantes fuertes con ninguna reacción violenta y sin humos producidos. Antes de realizar una mezcla, se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** RADIGROW XL no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



**PRECAUCION**



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO