

RadiGrow[®] XL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Acido 3 indol butírico (auxina)2.84 g/L
6 benzil amino purina (citoquinina)0.02 g/L
Aditivos.....c.s.p 1L

Reg.RCP N° - SENASA

Titular del registro:

DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
Jr.Niquel N° 282, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39
Telf: 544-4397

Formulado por:

Innovak Global S.A. de C.V.



Blvd Vicente Lombardo Toledano #6615
Col. Concordia Chihuahua, Chih. México
CP. 31375
Telf.: y Fax (614) 436-0138
www.innovakglobal.com

Importado y distribuido por:
AgroKlinge

Av. Separadora Industrial Mz. "E",
Lote 12 Urb. Santa Raquel 2da
Etapla, Ate. Lima-Perú. Telf.:
612-6565, R.U.C N° 20508704217

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCION

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES DE ADVERTENCIA DE USO Y APLICACION

- Evite el contacto con los ojos, la piel, puede causar irritación. Dañino si es ingerido.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No exponer a radiación solar.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura, hasta el momento de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Primeros Auxilios

- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con abundante agua y suministre un alcali débil (bicarbonato de sodio). No inducir al vomito si el paciente está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Buscar atención médica si persiste irritación.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado inmediatamente. Proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
- Antídoto: no existe antídoto específico. Tratar según síntomas. Teléfonos de emergencia: Llamar a ESSALUD: 411 8000 anexo 4, Infosalud: 0800-10-828, e Desarrollo Tecnico Vegetal S.A.C.: 544-4397

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. No permita animales en las zonas tratadas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- RADIGROW XL** es un regulador de crecimiento de plantas a base de citoquininas tipo 6 benzil amino purina y auxinas tipo ácido 3 indol butírico.
- Humedad: requiere condiciones de humedad en suelos próximos a capacidad de campo durante las 24 horas posteriores a su aplicación, para su mayor efectividad.
- Instrucciones de uso: Agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad, mida la cantidad a aplicar en recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.
- Uso dirigido a la raíz, se puede aplicar desde la siembra o trasplante hasta en etapas reproductivas a través del sistema de riego por goteo, micro aspersión o por drench dirigido a la base del tallo de la planta.

Consulta con un Ingeniero Agronomo

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACION	DOSES L/Ha	P.C (dias)	L.M.R (p.p.m)
Arandano	Pre brotación/Desarrollo vegetativo	2.0	N.A.	N.A.
Espárrago	Brotación/Desarrollo vegetativo	2.0	N.A.	N.A.
Papa	Siembra/ Emergencia	1.0	N.A.	N.A.
Vid	Cuajado	2.0	N.A.	N.A.

N.A. = No Aplica. P.C: Período de carencia (días).
L.M.R.= Límite máximo de residuo en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar RADIGROW XL, para inducir el crecimiento y desarrollo de nuevas raíces en los cultivos de arándano, espárrago, vid y papa.
- En arándano se recomienda realizar 2 aplicaciones cada 20 días, en espárrago 2 aplicaciones cada 30 días, en vid realice una aplicación al momento de cuajado, en papa aplicar a la siembra (ver cuadro de usos).

PERIODO DE REINGRESO 12 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD
Incompatible con oxidantes fuertes con ninguna reacción violenta y sin humos producidos. Antes de realizar una mezcla, se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
RADIGROW XL no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

