

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

RadiGrow[®] XL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Acido 3 indol butirico (auxina)2.84 g/L
6 benzyl amino purina (citoquinina)0.02 g/L
Aditivos.....c.s.p 1L

Reg.RCP N° 086- SENASA

Titular del registro:

DESARROLLO TÉCNICO VEGETAL S.A.C.
Jr.Niquel N° 262, Urb. Infantas
Los Olivos - Lima 39
Telf: 544-4397

Formulado por:

Innovak Global S.A. de C.V.

INNOVAK GLOBAL

Bvld Vicente Lombardo Toledano #6615
Col. Concordia Chihuahua, Chih.
México CP. 31375
Telf.: y Fax (614) 436-0138
www.innovakglobal.com

Importado y distribuido por:

AgroKlinge

AV. El Derby 254 INT. 306 Urb. El
Derby de Monterrico, S
Surco - Lima
Telf.: 641 - 00

FECHA DE FORMULACION

N° DE LOTE:

CONTENIDO NETO: 10 L

FECHA DE VENCIMIENTO:

PRECAUCION

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION"

- Evite el contacto con los ojos, la piel, puede causar irritación. Dañino si es ingerido.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No exponer a radiación solar.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura, hasta el momento de la aplicación.

Instrucciones de Primeros Auxilios

- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
 - En caso de ingestión, enjuague la boca con abundante agua y suministre un alcali débil (bicarbonato de sodio). No inducir al vomito si el paciente esta inconsciente.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Buscar atención médica si persiste irritación.
 - En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado inmediatamente. Proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario.
 - Antídoto: no existe antídoto específico. Tratar según síntomas.
 - Teléfonos de emergencia: SAMU: 106, Desarrollo Tecnico Vegetal S.A.C.: 544-4397
- ### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse, después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. No permita animales en las zonas tratadas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **RADIGROW XL** es un regulador de crecimiento de plantas a base de citoquininas tipo 6 benzyl amino purina y auxinas tipo ácido 3 indol butirico.
- Humedad: requiere condiciones de humedad en suelos próximos a capacidad de campo durante las 24 horas posteriores a su aplicación, para su mayor efectividad.
- Instrucciones de uso: Agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad, mida la cantidad a aplicar en recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión.
- Uso dirigido a la raíz, se puede aplicar desde la siembra o trasplante hasta en etapas reproductivas a través del sistema de riego por goteo, micro aspersión o por drench dirigido a la base del tallo de la planta.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACION	DOSIS		P.C	L.M.R
		L/Ha	L/200L		
Espárrago	Brotación/Desarrollo vegetativo	2.0		N.A.	N.A.
Papa	Siembra/ Emergencia	1.0		N.A.	N.A.
Vid	Cuajado	2.0		N.A.	N.A.
Palto	Crecimiento radicular	3.0		N.A.	N.A.
Piña	Desarrollo radicular		0.5	N.A.	N.A.
Arandano	Pre-brotación, brotación, Desarrollo vegetativo, floración y cosecha.	1.0 - 2.0		N.A.	N.A.

N.A. = No Aplica.

P.C: Periodo de carencia (días).

L.M.R.= Limite máximo de residuo en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **RADIGROW XL**. En arándano se recomienda realizar 1 aplicación en cada etapa fisiológica, en espárrago 2 aplicaciones cada 30 días, en vid realice una aplicación al momento del cuajado, en papa aplicar a la siembra, en piña realizar 2 aplicaciones: 1ra aplicación, 15 días después del trasplante, 2da aplicación, 15 después de la primera aplicación (una campaña por año), en palto realizar 3 aplicaciones por campaña (una campaña por año) y arroz aplicar a los 10 días después del trasplante.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con oxidantes fuertes con ninguna reacción violenta y sin humos producidos. Antes de realizar una mezcla, se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: **RADIGROW XL** no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

