"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FORMYL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

COMPOSICIÓN:

Reg. PQUA N° 2713 - SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCION DE UN INGENIERO AGRONOMO"

Titular de Registro:

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.

Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505, Miraflores, Lima, Peru Teléfono: (01) 222-2795



Formulador:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.

Room 10-6. Shidai Square. N° 8. Lengiing Street.

Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.

Teléfono: +86-574-87301088

Importador y Distribuidor: AGREVO ANDINA S.A.C.

Jr. San Sebastián Nro. 298-Urb. El Sol de la Molina II Etapa-La



Teléfono: +51-1-6328482

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: 10 KG

NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- o Este producto es TOXICO si se ingiere.
- Causa irritación moderada a los oios.
- o Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados O No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del
- O Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. O No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni
- o Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación
- o Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- o Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo.
- o Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

iabón v abundante aqua.

- o Grupo Químico: Carbamate o En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado. Eliminar lavando con
- O En caso de contacto con los gios: Lavarse abundantemente los gios con agua como medida de precaución por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos
- O Si es inderido: No inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente. Si está consciente dar de beber leche o gelatina si estos están disponibles, caso contrario grandes cantidades de agua.
- o Si es inhalado: Mueva a la persona al aire fresco. Brindar respiración artificial si
- o Antídoto. Atropina. Consulte al médico en todos los casos de sospecha de

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.: (01) 222-2795

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abeias u artrópodos benéficos.
- o No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- o No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos
- O Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento. o Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abeias.
- o Peligroso para organismos acuáticos.
- o No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- O No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del
- o Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10
- O El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- o Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- 0 En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FORMYL 90 PS, es un insecticida sistémico, de contacto e ingestión, afecta al sistema nervioso central del insecto, causándole la muerte

Aplicar con equipos terrestres, calcular la cantidad de agua a emplear, agregar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, luego se adiciona la cantidad del insecticida FORMYL 90 PS de acuerdo a la dosis recomendada, luego se agita la mezcla; finalmente se adiciona el resto de agua y se procede a la

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre cientifico	Kg/200 L	PC	LIVIR
Alcachofa (Cynara scolymus)	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	7	0.01
Esparrago (Asparagus officinalis)	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	1	2.0
Pimiento (Capsicum annuum)	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	0.2	7	0.7

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm) Volumen agua/ha=500 litros

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda máximo 2 aplicaciones por campaña/año, en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo y según la incidencia de la plaga.

Aplicar cuando la plaga este presente o cuando se dé las condiciones favorables para la rápida reproducción.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar a la zona tratada después de 24 horas.

COMPATIBIL IDAD:

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

















