12 cm

18 cm

BREAKER®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES – WG

Composición:

Tebuconazole..... 500 g/kg
Trifloxystrobin..... 250 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

PQUA N° - SENASA

Titular del registro, importador y distribuidor:
INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS
Calle 21 Nro. 713 Oficina 205 – San Isidro - Lima.
Teléfono: (01) 226-7332

Ipeh
Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas

Formulador:
Forward (Shanghai) Co., Ltd.
Room 4307, B.M. InterContinental Business Center 100 Yutong Road China Shanghai.
Tel: (021)61672710 Fax: (021)61672701

F. de form:
N° Lote
Contenido Neto: **1 Kg**
F. de venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

12 cm

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, heber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la direccion del viento.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Realice la aplicación, siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo químico: Triazoles (Tebuconazole) + Estrobilurina (Trifloxystrobin).
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, cuidando que los parpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del area contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antídoto específico, brindar atención sintomática.
- Telefonos:
CICOTOX: 0800-1-3040 **ESSALUD:** (01) 4118000 anexo 4
IPEH: (01) 226-7332

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para evitar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
BREAKER® es un fungicida sistémico, con acción protectora y curativa, compuesto de dos ingredientes activos que actúan de manera complementaria. Trifloxystrobin actúa inhibiendo la respiración mitocondrial y Tebuconazole inhibe la síntesis de ergosterol.

BREAKER® se prepra en una pre-mezcla con agua. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la pre-mezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente. agua al tanque de aspersión. Usar agua a pH 7.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar **BREAKER®** previa evaluación cuando se advierte los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	(Kg/Ha)	(días)	(ppm)
Vid	Oidiosis	*Erysiphe necator*	0.30	36	6*, 3**

PC: Periodo de Carencia (días) / **LMR:**Límites Máximos de Residuos (ppm) / *Tebuconazole, **Trifloxystrobin