

# COURAZE 700 WG

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

**Composición Química:**

Imidacloprid ..... 700 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Registro PQUA N° 876 - SENASA**

**Titular de Registro:** FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL  
Av. República de Panamá 3531  
Int. 1203, San Isidro - Lima, Perú.



**Formulado por:** SCHRIM GMBH DIVISION SIDECO  
Mecklenburger Strasse 229, D-23568  
Lubeck, Alemania.

**Importado, y  
Distribuido por:** SILVESTRE PERÚ S.A.C.  
Calle Arica 242 Miraflores Lima 18- Perú  
Telf: (01)617-3300  
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Contenido Neto: **70 kg**

F. de Form:  
N° Lote:  
F. de Venc:



PE\_RT - Rev.01 - 08/10/20

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

45 mm

	Cliente: FMC	CORES:
	Producto: RT - Couraze 700 WG - 70 Kg	PRETO
	Pais: Perú	PANTONE YELLOW C
	Revisão: PE_RT - Rev.01 - 08/10/20	PANTONE 343 C
	JOB:738/20	PANTONE 199 C
Formato: 210 mm X 300 mm		

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evitar respirar polvo y aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para reingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoides.
- Antídoto: No tiene Antídoto específico.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- Si el contacto fue por la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no provoque el vómito en la persona a menos que así o indique un profesional de la salud.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco, dar respiración artificial al paciente si fuera necesario.
- No dar nada de beber a un paciente que se encuentre inconsciente.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CISPROQUIM®: 080-050-847  
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811  
ESSALUD: 411-8000 -opción 4

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques, o arroyos con los desechos o envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**COURAZE® 700 WG**, es un plaguicida sistémico que actúa por contacto e ingestión. Actúa sobre el sistema nervioso del insecto, paralizando la conducción nerviosa y ocasionándole la muerte.

**COURAZE® 700 WG** se usa en pulverización foliar para la cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará en la aplicación.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña/año, aplicar cuando el nivel de daño económico lo justifique, previa evaluación del campo.

No aplicar en época de floración.

### PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

### COMPATIBILIDAD

**COURAZE® 700 WG** es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, con excepción aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

### FITOTOXICIDAD

**COURAZE® 700 WG** no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PIMIENTO	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.125	7	1.0
PAPA	“Mosquilla de los brotes”	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.150	21	0.5

PC: Período de Carencia.

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón).

