

14.5 ± 0.3 cm

2.2 cm

1.0 ± 0.2

48.0 ± 0.3 cm

1.0 ± 0.2

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10 km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Triazinonas**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
SAMU: 106  
NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



Titular del Registro:  
**NEOAGRUM S.A.C.**  
Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación  
Cajamarquilla, Lurigancho - Lima - Perú.  
Telf.: (01) 617-6400

Contenido neto: 20 L  
N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**DESBROZAL®**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composicion:

Metribuzin ..... 480 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2655 - SENASA



Importado y Distribuido por:  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242 - Miraflores;  
Lima 18 - Perú.  
Telf.: (01) 617-3300

Formulado por:  
**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.**  
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750#,  
Jinan, Shandong. CHINA.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DESBROZAL® es un herbicida sistémico usado para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales.  
DESBROZAL® actúa inhibiendo la fotosíntesis en las especies susceptibles.  
DESBROZAL® se aplica dirigido al suelo ya que es usado como un herbicida preemergente pero también puede ser usado en post emergencia temprana de las malezas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | PLAGA                                        |                                                                                                                   | DOSIS  |           | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común                                 | Nombre Científico                                                                                                 | L/200L | L/ha      |                |                 |
| Espárrago | Yuyo<br>Verdolaga<br>Grama china             | <i>Amaranthus hybridus</i><br><i>Portulaca oleracea</i><br><i>Sorghum halepense</i>                               | 0.2    | 0.4       | 14             | 0.05            |
| Tomate    | Amor seco<br>Hierba del gallinazo<br>Grama   | <i>Bidens pilosa</i><br><i>Chenopodium murale</i><br><i>Leptochloa uninervia</i>                                  | 0.2    | 0.4       | 7              | 0.05            |
| Papa      | Verdolaga<br>Capulí cimarrón<br>Yuyo<br>Yuyo | <i>Portulaca oleracea</i><br><i>Nicandra physalodes</i><br><i>Amaranthus dubius</i><br><i>Amaranthus hybridus</i> | -      | 0.3 - 0.5 | 17             | 0.6             |

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En el cultivo de tomate aplicar DESBROZAL® después del transplante a campo definitivo, cuando los plantines tengan de 4 a 6 hojas, en post emergencia temprana de las malezas. En el cultivo de espárrago aplicar DESBROZAL® en post cosecha, después del primer riego, en post-emergencia temprana de las malezas (2 a 4 hojas). En el cultivo de papa aplicar DESBROZAL® después del primer riego, en post-emergencia temprana (2 a 4 hojas).

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:

DESBROZAL® es compatible con los plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas, aquellos de reacción alcalina, oxidantes y ácidos fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

