

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es DAÑINO. No ingerir
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un ambiente (almacén) seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carboxamide y Anilinyrimidine
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
 - En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa, quitar el calzado y lavar con jabón y abundante agua.
 - En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos, incluso bajo los párpados. Si persiste la irritación, llevar al oculista.
 - Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

ESSALUD: 411-8000 PILARBIO PERU SAC: 363-8659

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase, y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Pilarcanil™

**PLAGUICIDA QUIMICO
DE USO AGRICOLA**

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspension Concentrada (SC)

Composición:

Boscalid220 g/L
Cyprodinil65 g/L
Aditivoscsp 1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: PILARBIO PERU SAC

Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B Urb. Chacarilla
Del Estanque
Tel.: 363-8659

Formulado por: JIANGSU MINDLEADER CROP SCIENCE, LTD.

N° 9, Konglian RD, Salinization New Material
Industrial Park, Huailian, China.
Tel: FAX: (+860517) 8990-6688.

Importado por: PILARBIO PERU SAC

Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B Urb. Chacarilla
Del Estanque
Tel.: 363-8659

Contenido Neto: 1 L

Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLO SMO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PILARCANIL es un fungicida compuesto por Boscalid y Cyprodinil, con acción sistémica y traslocadora. Actúa interfiriendo la respiración celular y la síntesis de aminoácidos y proteínas del hongo; en consecuencia, se inhibe la germinación y desarrollo de las esporas, así como la penetración y el crecimiento micelial del hongo tanto dentro de la planta como en la superficie foliar.

PILARCANIL se aplica en mezcla con agua. Se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en un balde o recipiente con agua, agitar bien y verterlo al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

CULTIVO	Plagas		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Pimiento	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.45	7	1 2 9
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	14	5 3 2

LMR: Límite Máximo de Residuos

¹Boscalid

PC: Período de Carencia.

²Cyprodinil

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación de la plaga, cuando aparezcan los primeros signos de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan su aparición. Realizar como máximo 1 aplicación/ campaña, considerando 1 campaña/año en Vid y 2 campañas/año en Pimiento. Rotar con fungicidas de diferente modo de acción con el fin de evitar la resistencia

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico al cultivo recomendado, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

