

## PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

# **FUNGICIDA AGRÍCOLA**

Suspencion Concentrada (SC)

### Composición:

 Boscalid
 220 g/L

 Cyprodinil
 65 g/L

 Aditivos
 csp 1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: PILARBIO PERU SAC

Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B Urb. Chacarilla

Del Estanque Tel.: 363-8659

Formulado por: JIANGSU MINDLEADER CROP SCIENCE, LTD.

N° 9, Konglian RD, Salinization New Material

Industrial Park, Huaian, China. Tel: FAX: (+860517) 8990-6688.

Importado por:

**PILARBIO PERU SAC** 

Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B Urb. Chacarilla

Del Estanque Tel.: 363-8659

Contenido Neto: 20 L

Lote N°. F. de Form. F. de Venc.

**NO CORROSIVO** 

NO INFLAMABLE

**NO EXPLOSIVO** 

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

# LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es DAÑINO. No ingerir
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un ambiente (almacén) seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

#### PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Carboxamide y Anilinopyrimidine

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente.
   No provoque el vómito.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa, quitar el calzado y lavar con jabón y abundante agua.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos, incluso bajo los párpados. Si persiste la irritación, llevar al oculista.
- Antidoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

#### TELÉFONO DE EMERGENCIA

ESSALUD: 411-8000 PILARBIO PERU SAC: 363-8659

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase
- , y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**PILARCANIL** es un fungicida compuesto por Boscalid y Cyprodinil, con acción sistémica y traslocadora. Actúa a interfiriendo la respiración celular y la síntesis de aminoácidos y proteínas del hongo; en consecuencia, se inhibe la germinación y desarrollo de las esporas, asi como la penetración y el crecimiento micelial del hongo tanto dentro de la planta como en la superficie foliar.

**PILARCANIL** se aplica en mezcla con agua. Se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en un balde o recipiente con agua, agitar bien y verterlo al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de acitación.

CULTIVO	Plagas		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre técnico	L/Ha	(días)	(ppm)
Pimiento	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.45	7	1 1 9 <sup>2</sup>
Vid	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	1.0	14	5 <sup>1</sup> 3 <sup>2</sup>

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia.

1 Boscalid

<sup>2</sup> Cyprodinil

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación de la plaga, cuando aparezcan los primeros signos de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan su aparición.

Realizar como máximo 1 aplicación/ campaña, considerando1 campaña/año en Vid y 2 campañas/año en Pimiento.

Rotar con fungicidas de diferente modo de acción con el fin de evitar la resistencia

#### PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

#### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico al cultivo recomendado, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Practicas Agrícolas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



























