

249.39 mm

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

- Este producto es DANINO. No ingerir
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un ambiente (almacén) seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Carboxamide y Anilino pirimidine
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa, quitar el calzado y lavar con jabón y abundante agua.
  - En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos, incluso bajo los párpados. Si persiste la irritación, llevar al oculista.
  - Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA**

ESSALUD:411-800 PILARBIO PERU SAC: 363-8659

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase, y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**P**ilarcanil™

**PLAGUICIDA QUIMICO  
DE USO AGRICOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Suspension Concentrada (SC)**

**Composición:**

Boscalid .....220 g/L  
Cyprodinil .....65 g/L  
Aditivos .....csp 1L

**Registro PQUA N° - SENASA**

**Titular de Registro: PILARBIO PERU SAC**

Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B Urb. Chacarilla  
Del Estanque  
Tel.: 363-8659

**Formulado por: JIANGSU MINDLEADER CROP SCIENCE, LTD.**

N° 9, Konglian RD, Salinization New Material  
Industrial Park, Huaian, China.  
Tel: FAX: (+860517) 8990-6688.

**Importado por: PILARBIO PERU SAC**

Calle Monte Rosa Nro. 271 Int. 7B Urb. Chacarilla  
Del Estanque  
Tel.: 363-8659

Contenido Neto: 25 L

Lote N°.  
F. de Form.  
F. de Venc.

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PILARCANIL** es un fungicida compuesto por Boscalid y Cyprodinil, con acción sistémica y traslocadora. Actúa a interfiriendo la respiración celular y la síntesis de aminoácidos y proteínas del hongo; en consecuencia, se inhibe la germinación y desarrollo de las esporas, así como la penetración y el crecimiento micelial del hongo tanto dentro de la planta como en la superficie foliar.

**PILARCANIL** se aplica en mezcla con agua. Se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en un balde o recipiente con agua, agitar bien y verterlo al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

CULTIVO	Plagas		Dosis L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Pimiento	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.45	7	1 2 9
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	14	5 <sup>1</sup> 3 <sup>2</sup>

**LMR:** Límite Máximo de Residuos

<sup>1</sup>Boscalid

**PC:** Período de Carencia.

<sup>2</sup>Cyprodinil

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar previa evaluación de la plaga, cuando aparezcan los primeros signos de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan su aparición. Realizar como máximo 1 aplicación/ campaña, considerando 1 campaña/año en Vid y 2 campañas/año en Pimiento. Rotar con fungicidas de diferente modo de acción con el fin de evitar la resistencia

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico al cultivo recomendado, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

160.00 mm



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

