"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.**
- **Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.**
- **Este producto puede ser mortal si se ingiere.**
- **Evitar el contacto con la piel y la ropa. Causa irritación moderada a los ojos.**
- **No almacenar en casas de habitación.**
- **No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.**
- **No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.**
- **Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.**
- **No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.**
- **Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.**
- **Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.**

Características del equipo y ropa de protección: Los operarios deberán llevar equipos protectores y de aplicación en perfectas condiciones.

Almacenamiento: Almacenar el producto en sus envases originales, etiquetado y debidamente cerrados en lugares secos y ventilados, bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta Hoja Informativa.**
- **No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.**

Instrucciones de primeros auxilios en caso de: Inhalación: Mantener al paciente al aire libre, en reposo y abrigado, hasta que llegue el médico. **Ingestión:** En caso de ingestión accidental. NO INDUZCA EL VÓMITO. Beba grandes cantidades de agua. Evite el alcohol. Busque atención médica. **Contacto con los ojos y piel:** En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, quite las prendas contaminadas y lave la parte afectada con abundante agua y jabón.

INDICACIONES AL MÉDICO: Realice tratamiento sintomático y de sostén. Daños a la mucosa pueden contraindicar el uso de lavado de estómago. No utilice emético.

ANTÍDOTO: No hay uno específico.

Teléfono de emergencia: SAMU: 106 AGRO KLINGE S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para los organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Instrucciones del lavado de los equipos de aplicación: Una vez terminado el trabajo, los equipos y utensilios de aplicación deben lavarse prolijamente con abundante agua, llenando y vaciando los tanques por tres veces en lugares ya tratados. Limpie bien los picos y tuberías del asperor. **Evitar daño a la fauna benéfica:** Aplíquese únicamente como se especifica en la etiqueta. **Evitar la contaminación de fuentes de agua:** Los restos del plaguicida y los productos de enjuague de recipientes deberán aplicarse a un área ya tratada. **Manejo de derrames:** En caso de derrames, absorba el producto inmediatamente con aserrín o tierra, recoja el material absorbente, colóquelo en una bolsa y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Limpie el área contaminada con agua.

Epingle® 10 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRICOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
Registro PQUA Nº 195-SENASA

Contenido del ingrediente activo:
Pyriproxyfen..... 100 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

Nombre químico IUPAC:
4-Phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy) propyl ether

Formula estructural:



Formula empírica
$C_{20}H_{19}NO_3$

Peso molecular: 321.5 g/mol
Apariencia: Líquido ligeramente amarillo
Olor: Levemente característico
pH: 5,57
Densidad: 0,920 g/ml
Corrosivo: No corrosivo
Inflamabilidad: No Inflamable
Explosividad: No explosivo
Presentaciones: Frasco por 0.250 L, 0.500 L, 1 L, 200 L.

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
AgroKlinge
a member of ADAMA
Av. El Derby 254. Int. 306. Santiago de Surco. Lima-Perú. Telef.: (01) 641-0000

Formulador:
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
27-1, Shinkawa 2-Chome,
Chuo-Ku. Tokio, 104 Japón
Telf.:03-5543-5731

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis ml/Cil. 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Páprika	"Mosca blanca"	*Bemisia tabaci*	50 - 100	3	0,2
Pimiento	"Mosquilla de los brotes"	*Prodiplosis longifila*	100 - 150	28	0,6
Espárrago	"Trips"	*Thrips tabaci*	50 - 100	14	0,1
Mandarino	"Queresa coma"	*Lepidosaphes beckii*	50 - 100	30	0,5
Palto	"Mosca Blanca" "Queresa del Palto"	*Aleurodicus juleikae* *Fiorinia fioriniae*	100 - 150 150 - 200	30	0,05
Mango	"Queresa del Mango"	*Protopulvinaria manguiferae*	150 - 200	30	0,05
Cebolla	"Trips"	*Thrips tabaci*	150 - 200	14	0,05
Vid	"Trips" "Cochinilla harinosa"	*Thrips tabaci* *Planococcus ficus*	150 - 200	21	2,5

P.C.= Período de carencia **L.M.R. = Límite máximo de residuos**

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha, Frutales: 1,000 a 2,000 L/ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar una (01) vez por campaña, considerando una (01) campaña por año para los cultivos de palto, mango, vid, pimiento y mandarina; y dos (02) campañas para los cultivos de páprika, espárrago y cebolla.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: EPINGLE 10 EC es un insecticida que controla selectivamente queresas, moscas blancas y trips en sus estados inmaduros. Actúa por contacto e ingestión. El control se observa a partir del tercer día después de la aplicación. Pyriproxyfen es un imitador de la hormona juvenil de los insectos, que controla el proceso de la muda y el cambio de estado, su acción suprime la embriogénesis, inhibiendo la formación del adulto, lo que resulta en cambios que causan la muerte del insecto.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

EFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS: Ninguno.

EFECTOS SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS: Ninguno.

NÚMERO MÁXIMO DE APLICACIONES SUCESIVAS/COSECHA/CAMPAÑA: 1 aplicación.

MÉTODOS DE APLICACIÓN: Las aplicaciones pueden hacerse con cualquier equipo de aspersión terrestre, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.

EQUIPO DE APLICACIÓN Y SU CALIBRACIÓN: Los equipos de aplicación deben estar en perfectas condiciones. Asegurarse que el equipo de aplicación no gotee o tenga escape del preparado. Revise los filtros, boquillas, mangueras, empaques, ajustes de las mangueras, palanca y émbolo para que funcionen con precisión antes de comenzar los trabajos. Las aplicaciones pueden hacerse con cualquier equipo de aspersión terrestre o aérea en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

INTERVALO ANTERIOR DE LA COSECHA: Variable dependiendo del cultivo.

Peligroso para los organismos acuáticos.

No contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

UI: 101219 V2

HOJA INFORMATIVA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Alto:14 cm
Ancho: 18,3 cm