

22,3 ± 0,3

0,7 ± 0,2 0,3 ± 0,2

12,0 ± 0,3

1,8

Medidas en cm

CRUEL
150SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
Suspensión Concentrada (SC)

Registro SQA N° 2729 - SENASA

Composición:
Indoxacarb 150 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (ppm)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	g/ha		
MAÍZ	"Cogolero"	Spodoptera frugiperda	0,15	15	0,02	

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Período de Carencia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación de CRUEL® 150 SC por campaña, cuando se observen las primeras larvas de la plaga en el cultivo.

PERIODO DE RENGRESO
Se puede regresar al campo con equipo de protección durante las primeras 48 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y abonos líquidos utilizados convencionalmente en los cultivos recomendados. Antes de efectuar las mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea añadir.
Siempre diluir primero. No mezclar con materiales oxidantes y ácidos.

FOTOTOXICIDAD
No existen reportes de fototoxicidad si el producto es aplicado de acuerdo a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.
Av. Nicolás de Ayllón N° 2941 dpto. 7A Z.I.
El Agustino, Lima - Perú.
Telf.: (01) 644-9287

Formulado por:
JIXI AGRISING BIOTECH CO. LTD.
No. 7 Jiangyang East Road, Jiao County
Anhui Province China.

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

Contenido Neto: 400 ml
N° Lote:
F. de Vern.:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

Envase: PEAD

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la suspensión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede ocasionar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Después de usar este producto cámbiese. Lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
- Usar ropa protectora durante el empaque y aplicación (guantes largos resistentes a químicos, máscara de respiración con filtro de carburo para vapores orgánicos con un prefiltro para material particulado, botas altas hasta la pantorrilla resistentes a químicos, calzado resistente sobre la suela de trabajo de algodón, capucha impermeable y gafas de seguridad o lentes de protección, visor contra salpicaduras para proteger al área tratada dentro de las primeras 24 horas).
- Consumir el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Oxadiazoles.
- En caso de intoxicación: Lleve al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela etiqueta y la hoja informativa adjunta, no deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel: Retire la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de soporte. El diazepam puede ser útil para controlar los espasmos convulsivos inducidos por el indoxacarb.
- Antídoto: No tiene antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0 800 1 2061 120-1208. Atención las 24 horas (gratis)
CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS DE SALUD: 117 (gratis)
CEPROQUIM: 661-600-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y envíe la solución en el método de aplicación y luego muéstralo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Quemarlo en un sitio triple lavado al centro de acopio autorizado.
- No destruir el envase que contiene el producto del presente envase.

MEASURAS PARA LA PROTECCIÓN Y DEL AMBIENTE

- El producto es tóxico para abejas y otros animales beneficiosos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas comenzando la tarde. Evitar la lluvia por el viento.

CRUEL
150SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
Suspensión Concentrada (SC)

Registro SQA N° 2729 - SENASA

Composición:
Indoxacarb 150 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (ppm)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	g/ha		
MAÍZ	"Cogolero"	Spodoptera frugiperda	0,15	15	0,02	

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Período de Carencia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación de CRUEL® 150 SC por campaña, cuando se observen las primeras larvas de la plaga en el cultivo.

PERIODO DE RENGRESO
Se puede regresar al campo con equipo de protección durante las primeras 48 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y abonos líquidos utilizados convencionalmente en los cultivos recomendados. Antes de efectuar las mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea añadir.
Siempre diluir primero. No mezclar con materiales oxidantes y ácidos.

FOTOTOXICIDAD
No existen reportes de fototoxicidad si el producto es aplicado de acuerdo a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.
Av. Nicolás de Ayllón N° 2941 dpto. 7A Z.I.
El Agustino, Lima - Perú.
Telf.: (01) 644-9287

Formulado por:
JIXI AGRISING BIOTECH CO. LTD.
No. 7 Jiangyang East Road, Jiao County
Anhui Province China.

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

Contenido Neto: 400 ml
N° Lote:
F. de Vern.:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

Envase: PEAD

CRUEL
150SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
Suspensión Concentrada (SC)

Registro SQA N° 2729 - SENASA

Composición:
Indoxacarb 150 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (ppm)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	g/ha		
MAÍZ	"Cogolero"	Spodoptera frugiperda	0,15	15	0,02	

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Período de Carencia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación de CRUEL® 150 SC por campaña, cuando se observen las primeras larvas de la plaga en el cultivo.

PERIODO DE RENGRESO
Se puede regresar al campo con equipo de protección durante las primeras 48 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y abonos líquidos utilizados convencionalmente en los cultivos recomendados. Antes de efectuar las mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea añadir.
Siempre diluir primero. No mezclar con materiales oxidantes y ácidos.

FOTOTOXICIDAD
No existen reportes de fototoxicidad si el producto es aplicado de acuerdo a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.
Av. Nicolás de Ayllón N° 2941 dpto. 7A Z.I.
El Agustino, Lima - Perú.
Telf.: (01) 644-9287

Formulado por:
JIXI AGRISING BIOTECH CO. LTD.
No. 7 Jiangyang East Road, Jiao County
Anhui Province China.

Importado y Distribuido por:
SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

Contenido Neto: 400 ml
N° Lote:
F. de Vern.:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

Envase: PEAD

ETIQUETA PARA PRODUCTO DE SENASA