

LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Causa irritación a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado. plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estrobilurin y Cloronitrile
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- Teléfonos de Emergencia : CICOTOX: 0800-13040 (gratuito)
ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- "Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado".
- "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase".

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos de 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

ARMAGAN 66 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin..... 60 g/L
Chlorothalonil 600 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L.

Reg. PQUA N° XXX-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

PEDRO PABLO MARTINEZ MORENO

RUC: 10476547763

Dirección: Calle Loma de las limas #147,
Urb. Prolong. Benavides, Santiago de Surco, Lima, Lima

FORMULADO POR: AGRIA S.A.

Dirección: 1408 Sofía, 75-83 Dimitar Manov Str., BULGARIA

Tel: (02) 915 05 00; 915 05 11

Correo: info@agria.bg

Fecha de formulación:

Nº de lote:

Contenido neto: 500 ml.

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARMAGAN 66 SC es una combinación de fungicidas sistémicos y de contacto que proporciona un control de amplio espectro. Realice una aplicación, antes del brote de la enfermedad, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Si las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo continuo de la enfermedad, realice una segunda aplicación después de 14 a 21 días, dependiendo de la gravedad de la presión de la enfermedad.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	PLAGAS		Dosis (L/Ha)	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Mango	Antracnosis	Colletotrichum gloeosporioides	1.5 -1.75	21 ^{A,B}	0.10 ^A 0.01 ^B

LMR = Limite Maximo de Residuos | PC = Periodo de Carencia

^A = Azoxystrobin | ^B = Chlorothalonil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar ARMAGAN 66 SC una (1) aplicación por campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO: Ingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: No es fitotóxico a las dosis y en los cultivos recomendados.

FITOTOXICIDAD: No evidencia fitotoxicidad si se emplea a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

