

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ADENTIS 20 SP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

COMPOSICIÓN

Acetamiprid..... 200 g/Kg.

Aditivos..... c.s.p. 1 Kg.

PQUA N° 2749-SENASA

TITULAR DE REGISTRO: AGRO INGENIUM S.A.C.

RUC: 20601259673

Dirección: Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima

Tel.: +51 992-773-871

FORMULADO POR:

AGRIA S.A.

Sofía 1408, 75-83 C/Dimitar Manov - BULGARIA

Tel: 02 915 05 00; 915 05 11

IMPORTADO POR:

TITULAR DE REGISTRO: AGRO INGENIUM S.A.C.

RUC: 20601259673

Dirección: Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima

Fecha de formulación:

N° de lote:

Contenido neto: 20 Kg.

Fecha de Vencimiento:



AGRIA S.A.
PLANT PROTECTION FOR PROFITABLE FARMING

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 AGRO INGENIUM S.A.C.: 992-773-871

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para abejas y/o artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo o cultivos aledaños.
- Aplicar en horas de menor viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS (Kg/Cil) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---------|--------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| | NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | | | |
| Tomate | Mosca blanca | <i>Bemisia tabaci</i> | 0.1 | 7 | 0.2 |

PC = Periodo de Carencia | LMR = Limite Maximo de Residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ADENTIS es un insecticida Neonicotinoide que actúa por contacto e ingestión, presenta también actividad sistémica y translaminar. Actúa a nivel del sistema nervioso central de los insectos, provocando la transmisión ininterrumpida de los impulsos nerviosos que lleva a la parálisis y muerte del insecto. Emplear equipo de pulverización terrestre, gotas finas y cobertura uniforme. Realizar la aplicación en condiciones climáticas favorables. Antes de la aplicar, calibrar el equipo y esperar que el rocío seque. En plantas grandes de tomate utilizar mochila a motor para asegurar una buena cobertura y lograr que el producto llegue hasta envés de la hoja en donde se esconde y alimenta la mosca.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. Se recomienda realizar máximo dos (2) aplicaciones por campaña considerando 1 campaña al año y antes de la aparición de los síntomas de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar a las áreas tratadas sin vestimenta de protección hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

ADENTIS es compatible con la mayoría de producto fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

277.00 mm

189.16 mm