

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

•Este producto es DAÑINO, no ingerir. •Poligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión. •Evite contacto con la piel y ropa. Causa irritación moderada a los ojos. •No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. •No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. •Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. •Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. •No almacenar el producto junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje. •Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. •Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. •Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

•Grupo químico: Avermectinas.
•Antídoto: Este producto no tiene antídoto. El tratamiento es sintomático.
•En caso de intoxicación llame al médico o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta. •En caso de ingestión: No inducir al vómito. Dar a beber agua sólo si el afectado está consciente. •En caso de inhalación: Traslúde al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario. •En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón. •En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente los ojos con agua fresca por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.
•Teléfonos de emergencias: GISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

•Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
•Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
•Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

•Tóxico para abejas y artrópodos beneficios. •No aplicar en época de floración. No aplicar en presencia de polinizadores. •No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes. •Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento. •Notificar a los agricultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas. •Poligroso para organismos acuáticos. •No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. •No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. •Poligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. •El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. •En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Rampa®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Abamectin 18 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. N°

Titular del Registro:
FARMEX S.A.

Formulado y Distribuido por:



FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 20 L

Lote N°:

F. Form.:

F. Venc.:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca registrada de FARMEX S.A.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAMPA® es un acaricida - insecticida que actúa por ingestión y contacto, paralizando en corto tiempo ácaros fitófagos e insectos minadores. RAMPA® se absorbe rápidamente a través de las hojas lo que permite controlar insectos minadores con un prolongado efecto residual.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

RAMPA® se aplica en pulverización empleando tanto equipos terrestres como aéreos. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSES mL/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ALCACHOFA	Mosca Minadora	Ameletus rosaliae	150 - 200	7	0.01
CUCURBITACEAS (pepinos, pimientos, pimientos)	Ácaro helado	Polyphagotarsonemus latus	150 - 200	3	0.02
	Minador de la hoja	Phyllocnistis citrella	100	7	0.01
CÍTRICOS (mandarina, naranja dulce, limón natif, limón)	Ácaro del brote	Phylloxera citrella	100		
	Análisis rojo de los cítricos	Panonychus citri	150 - 200	7	0.01
MANGO	Análisis broscado	Tetranychus citrinus	150 - 200	28	0.01
PALTO	Ácaro	Oligonychus puniceus	150	12	0.01
PAPA	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	200	7	0.01
	Ácaro helado	Polyphagotarsonemus latus	100		
VID	Análisis broscado	Tetranychus citrinus	150 - 200	28	0.01

L.M.R.: Límite máximo de residuos. P.C.: Período de carencia en días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

En todos los casos, el intervalo de aplicación es de 14 días o más, dependiendo del nivel de infestación. En los cítricos no hacer más de 3 aplicaciones por campaña, mientras que para papa, no superar las 2 por campaña. La época de aplicación depende de cada cultivo.

PERIODO DE REINGRESO. No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD. Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe corregir el pH del agua y probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

RAMPA® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

