

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**“MANTÉNGANSE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- Usar lentes protectores y respirador cuando se manipule el producto.
- No utilice este envase para conservar alimentos o agua.

**PRIMERO AUXILIOS**

- Grupo químico: Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Antídoto: no hay antídoto específico.

**Teléfonos de Emergencia:**

**CICOTOX: (01) 328-7700 / ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.: (01) 499-7831**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Utilizar una banda de protección hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

# COMODIN<sup>®</sup>

## 10 EC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Alpha-cypermethrin ..... 100 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 2753 - SENASA



**Titular del Registro, Importador y Distribuidor:**

**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**

Av. Javier Prado Este N° 6728 Int. 301-A  
 Urb. Santa Patricia II Etapa  
 La Molina, Lima, Perú  
 Teléfono: (01) 499-7831

**Formulado por:**

**Point Agro - China Ltd.**  
 Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu 214217.  
 China



Contenido Neto : 1 L  
 Lote N° :  
 Fecha de formulación :  
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**COMODIN 10 EC** es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión, y es empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta. Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme. Se recomienda que, diluido el producto, no puede ser almacenado por más de 12 horas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivos	Plaga		Dosis (ml/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Alfalfa	“Gusano ejército”	<i>Spodoptera peruviana</i>	125	14	0,5
	“Gusano rosado”	<i>Pectinophora gossypiella</i>	125	14	0,1
Algodón	“Arrebiatado”	<i>Dysdercus peruvianus</i>	125	14	0,1
Col	“Gusano de la col”	<i>Plutella spp.</i>	125	14	1,0
Frijol	“Gusano medidor”	<i>Chrysodeixis (=Pseudoplusia) spp.</i>	150	14	0,05
Maíz	“Cogollero”	<i>Spodoptera frugiperda</i>	125	14	0,05
Papa	“Mosca minadora”	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100	14	0,05
Sandía	“Barrenador de frutos y guías”	<i>Diaphania spp.</i>	125	14	0,05
Tomate	“Polilla”	<i>Tuta absoluta</i>	150	14	0,1

LMR= Límite máximo de Residualidad, en partes por millón P.C.= Período de carencia en días

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas como mínimo.

**COMPATIBILIDAD:** No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro con el distribuidor del producto.



Pantone Yellow C



Triangulo- Pantone 555 C



Gota - Pantone 639 C