

# SuperAct<sup>®</sup> 25 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

**COMPOSICIÓN:**

Thiamethoxam..... 250 g/Kg  
Aditivos .....c.s.p. 1 Kg

**Reg. PQUA N° 900 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:  
CAPEAGRO S.A.C.**



**IMPORTADOR Y  
DISTRIBUIDOR:**

**FORMULADO POR:**

**OASIS AGROSCIENCE LIMITED.**

Room 1510, N°500, Xinjian Road,  
Shanghai CHINA

**CAPEAGRO S.A.C.**

Av. Benavides 2150. Ofic. 803

Miraflores - Lima

[www.capeagro.com](http://www.capeagro.com)

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

**100 g**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos.
- Durante la manipulación y aplicación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, antiparras, guantes, botas, mascarilla o tapaboca y para reingresar al área tratada.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco alejado del calor y bajo llave.
- No almacenar este producto en casas de habitación.

## PRIMEROS AUXILIOS:

### GRUPO QUÍMICO: NEONICOTINOIDE

- En caso de contacto con la piel: Quitar rápidamente la ropa contaminada.
- Lavar la zona afectada con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto ocular: Inmediatamente lavar con grandes cantidades de agua durante 15 minutos como mínimo, manteniendo los párpados abiertos.
- Llevar al médico (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre.
- Monitorear la dificultad respiratoria. Avisar al personal médico.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito o dar algo por la boca a una persona inconsciente. No dejar a la víctima desatendida. Llevar inmediatamente para la atención médica.
- Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

## EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** Llamar a CICOTOX: 0800-13040. CIPROSQUIM: 0800-50847  
ESSALUD: 411 8000 anexo 4. CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas, no aplicar en plena floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrante del producto.
- No debe aplicarse en zonas con napa freática alta.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Aplicar de preferencia por las mañanas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **SUPERACT 25 WG** es un insecticida que actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso de los insectos.

**Modo de Preparación:** Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **SUPERACT 25 WG** (Thiamethoxam) máximo 2 aplicaciones por campaña, en presencia de la plaga luego de haber efectuado una evaluación del campo y considerando el umbral económico del cultivo.

## PERIODO DE REINGRESO:

Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

## COMPATIBILIDAD:

El producto es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios comúnmente usados.

## FITOTOXICIDAD:

En los diferentes ensayos de campo realizados con la sustancia activa no se han detectados respuestas fitotóxicas a las dosis recomendadas de aplicación. Por lo tanto no son de esperar reacciones fitotóxicas derivadas de la aplicación del producto.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

## “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	kg/200L de agua	kg/ha		
Vid	“Cochinilla harinosa”	Planococcus citri	0.08	--	21	0.9
Palto	“Queresa”	Fiorinia fioriniae	0.075	--	60	0.4
Páprika/Jalapeño/ Piquillo/Morrón	“Mosca blanca”	Bemisia tabaci	0.07-0.1	0.175-0.25	3	0.5

\*P.C.: Periodo de carencia (días)

\*\*L.M.R.: Límite máximo de residuos (partes por millón)

