

0.5 cm

18 cm

0.5 cm

0.5 cm

24 cm

0.5 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ULTRA PLUS

400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN:

Pendimethalin

400 g/L

Aditivos (surfactante)

120 g/L

Solvesso 150

c.s.p. 1L

Reg. PQUA Nº 2759 - SENASA

INAP

Insumos Agrícolas Peruanos

Titular del registro:
INSUMOS AGRÍCOLA PERUANOS S.A.C.
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por:
POINT AGRO - CHINA LTD.
Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu
214217. China

Agropecuaria Chimú

...sin compromiso con el agro

Importado y Distribuido por:
AGROPECUARIA CHIMU S.R.L.
Av. César Vallejo Nº 310 Urb. Palermo
Trujillo, La Libertad, Perú
Teléfono: (044) 203962 Anexo 211

Contenido Neto: 4L

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

0.5 cm

24 cm

0.5 cm

0.5 cm

18 cm

0.5 cm

0.5 cm

24 cm

0.5 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Cuidado, evite el contacto con el producto, posible carcinógeno.

- Causa irritación moderada a los ojos. Usar gafas o protección ocular durante la mezcla y aplicación.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.

- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.

- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Dinitroanilinas

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.

- En caso de ingestión, si el paciente está conciente, lavar la boca y dar a beber abundante agua. No inducir al vómito. Contactar a un médico.

- En caso de inhalación, traslade al paciente a un lugar fresco y bien ventilado y mantenerlo en reposo.

- No se ha determinado antídoto específico.

- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / INAP: (01) 499-7831

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, incluyendo algas y plantas acuáticas.

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ULTRAPLUS 400 EC es un herbicida selectivo con actividad sistémica perteneciente al grupo de las dinitroanilidas. Actúa inhibiendo la división y elongación celular de los meristemas y tallos. Se recomienda para el control pre y post emergente de malezas gramíneas anuales y de hoja ancha; tiene un largo poder residual.

ULTRAPLUS 400 EC se emplea diluido en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

ULTRAPLUS 400 EC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZAS		Dosis (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Alcachofa	Cadillo	Cenchrus echinatus	2.0 - 2.5	60	0.1
	Pata de Gallina	Eleusine indica			
	Moco de Pavo	Echinochloa crus-galli			
	Lechera	Euphorbia peplus			
	Yuyo	Amaranthus dubius			
	Rajamano	Sida spinosa			
Cebolla	Verdolaga	Portulaca oleracea	1.5	45	0.1
	Pata de Gallina	Eleusine indica			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Yuyo	Amaranthus dubius			
Arroz	Pega Pega	Setaria verticillata	2.0	105	0.1
	Gramma	Cynodon dactylon			
	Oreja de ratón	Heteranthera reniformis			
	Arrocillo	Echinochloa colonnum			
	Moco de pavo	Echinochloa crus-galli			
	Junco	Cyperus difformis			
Verdolaga	Portulaca oleracea				

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Alcachofa, arroz y cebolla: máximo 1 aplicación/campaña/año. Alcachofa: una sola aplicación antes del trasplante de los hijuelos de alcachofa y antes de la emergencia de las malezas. La aplicación debe hacerse en suelo húmedo cubriendo el área del surco así como el lugar donde se colocará el hijuelo.

PERÍODO DE REINGRESO: Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado a la dosis y momentos de aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

0.5 cm

24 cm

0.5 cm

0.5 cm

24 cm

0.5 cm