

# Sanifol WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA


**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

GRANULOS DISPERSABLES - WG

## COMPOSICIÓN

Boscalid .....	252 g/kg
Pyraclostrobin .....	128 g/kg
Aditivos .....	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2756 - SENASA



**Point**  
ENTREGAMOS  
CALIDAD

Titular de Registro, Importado y  
Distribuido por:  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto 304 Urbanización Santa Patricia  
II Etapa. La Molina. Lima Perú  
Teléfono: 3481018 - 3499609

Formulado por:  
**POINT AGRO-CHINA LTD**  
Wan Shi Town,  
Yixing, Jiangsu; 214217 China  
Tel (86-510) 8785 1001

Contenido neto: 1kg  
Número de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Carboxamida y Strobilurina.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua por 15 a 20 minutos, remover los lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, beber y enjuagar la boca con abundante agua. No administrar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y enjuagar la piel con abundante agua por 15 a 20 minutos. Retire la ropa y calzado. Eliminar lavando en jabón y abundante agua.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado. Si la persona tienen dificultad para respirar, dar respiración artificial.

Antídoto: Este producto no tiene antídoto.

En caso de emergencias llamar a:  
CICOTOX: 328 7700 ; ESSALUD: 411 8000 opción 4  
CISPROQUIM: 0800 50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**  
Después de usar el contenido inutilice este envase triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**SANIFOL WG** es un fungicida sistémico, cuyos ingredientes activos: Boscalid y Pyraclostrobin, tienen propiedades preventivas y curativas. Mientras que Boscalid inhibe la germinación de esporas, elongación del tubo germinal, crecimiento micelial, y esporulación, Pyraclostrobin inhibe la respiración mitocondrial, conllevando a la reducción de la energía rica en ATP, necesaria para el desarrollo de muchos procesos esenciales de la célula fungosa. La presencia de ambos ingredientes activos, complementan y potencian la acción del producto, sin riesgo de resistencia cruzada. Por lo que es muy útil para los programas de manejo anti-resistencia.

Para su aplicación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda 2 aplicaciones por campaña por año. Aplicar al inicio de floración, y la segunda aplicación dos a tres semanas después de la primera aplicación.

## PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD:

**SANIFOL WG** puede ser aplicado en mezcla con la mayoría de fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares. Sin embargo se recomienda hacer una mezcla previa de compatibilidad.

## FITOTOXICIDAD:

**SANIFOL WG** no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		Dosis kg/cil	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.24*	3	10** 0.5***

\*Gasto de agua: 600 L/Ha

\*\*Boscalid

\*\*\*Pyraclostrobin

P.C: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón)

