

# Poseidon

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

**COMPOSICIÓN**

Fludioxonil ..... 250 g/kg  
 Cyprodinil ..... 375 g/kg  
 Aditivos ..... c.s.p. 1kg

Reg. PQUA Nº - SENASA

**VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Titular de Registro:  
**FARMEX S.A.**  
 Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7, San Isidro.Lima, Perú  
 Teléfono: (01) 630-6400

Formulado por:  
**QINGDAO AUDIS BIO. TECH. CO., LTD.**  
 2/F, Hailir Mansion, No.216, Guocheng Road, Chengyang  
 Dist.Qingdao, Shandong, 266109 China  
 Teléfono: +86-53258659179

Importado y distribuido por:



Fecha de Formulación:  
 N° de Lote:  
 Contenido Neto:  
 Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Phenylpyrrole + Anilino pirimidine

**Teléfonos de emergencia:**  
**CISPROQUIM: 080-050-847,**  
**FARMEX S.A.: (01) 6306400**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, enrollar las bolsas vacías empezando por la parte abierta, destruya el envase y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**POSEIDON**, está compuesto por 2 ingrediente activos: fludioxonil, el cual es un fungicida de contacto de alto poder residual y el cyprodinil el cual es un fungicida sistémico, los cuales se utilizan en aplicaciones foliares a manera de aspersión manual de mochila para prevenir y controlar el moho gris.

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

Llene el tanque con agua hasta un tercio del agua a utilizar, añada la dosis recomendada de **POSEIDON**, agite hasta lograr una mezcla homogénea, finalmente complete con la cantidad de agua necesaria. Continúe agitando hasta antes de iniciar la aplicación.

Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Las aplicaciones se pueden realizar desde la floración y durante la fructificación ya que el tomate es un cultivo de constante floración incluso paralela a la formación de los frutos..

**PERIODO DE REINGRESO:**

No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD: POSEIDON** es

compatible con plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes fuertes,

**FITOTOXICIDAD:** no es fitotóxico a los

cultivos indicados en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de

registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVOS	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	N. Común	N. Científico	g/cil		
Tomate	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	500	3	*3 **1.5

\*Fludioxonil

\*\*Cyprodinil

P.C. = Período de carencia en días.  
 L.M.R. = Límite máximo de residuos en partes por millón

LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO

