

Poseidon

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN

Fludioxonil 250 g/kg
Cyprodinil 375 g/kg
Aditivos: c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° - SENASA

VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Titular de Registro:

FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7, San Isidro, Lima, Perú
Teléfono: (01) 630-6400

Formulado por:

NINGBO SYNAGROCHEM CO.,LTD

N° 757, Rili Middle Road, Ningbo 315199, China.
Teléfono: +86-574-8309 9909

Importado y distribuido por:



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Phenylpyrrole + Anilinopyrimidine
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de emergencia:
CISPROQUIM: 080-050-847,
FARMEX S.A.: (01) 6306400

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enrollar las bolsas vacías empezando por la parte abierta, destruya el envase y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos de 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficial o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

POSEIDON, está compuesto por 2 ingredientes activos: fludioxonil, el cual es un fungicida de contacto de alto poder residual y el cyprodinil el cual es un fungicida sistémico, los cuales se utilizan en aplicaciones foliares a manera de aspersión manual de mochila para prevenir y controlar el moho gris.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llene el tanque con agua hasta un tercio del agua a utilizar, añada la dosis recomendada de POSEIDON, agite hasta lograr una mezcla homogénea, finalmente complete con la cantidad de agua necesaria. Continúe agitando hasta antes de iniciar la aplicación.

Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS g/cil	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	N. Común	N. Científico			
Tomate	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	500	3	*3 **1.5

*Fludioxonil

**Cyprodinil

P.C. = Período de carencia en días.

L.M.R. = Límite máximo de residuos en partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones se pueden realizar desde la floración y durante la fructificación ya que el tomate es un cultivo de constante floración incluso paralela a la formación de los frutos.

PERIODO DE REINGRESO: No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: POSEIDON es compatible con plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes fuertes,

FITOTOXICIDAD: no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

