21.00 centímetros

0.50 cm

0.50 cm

0.50 cm

30.00 centímetros

0.50 cm

0.50 cm

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Poseidon

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Fludioxonil	250 g/kg
Cyprodinil	375 g/kg
Aditivos .....c.s.p.....	1 kg

Reg. PQUA Nº 2758-SENASA

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**
Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU

Formulado y distribuido por:

Farmex

Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 – PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 25 kg

Nº de lote :
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), use camisa de manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.
- El uso inadecuado de este producto causa daños a la salud y al ambiente.
- No almacenar en casa de habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- **Grupo químico:** Phenylpyrrole +Anilinopyrimidine.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión medica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15minutos, cuidando que los parpados estén abiertos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depósitela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos de 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficial o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

INSTRUCCCIONES DE USO Y MANEJO
POSEIDON, está compuesto por dos ingredientes activos: fludioxonil, el cual es un fungicida de contacto de alto poder residual y el cyprodinil el cual es un fungicida sistémico, los cuales se utilizan en aplicaciones foliares a manera de aspersión manual de mochila para prevenir y controlar el moho gris.
Llene el tanque con agua hasta un tercio del agua a utilizar, añada la dosis recomendada de **POSEIDON,** agite hasta lograr una mezcla homogénea, finalmente complete con la cantidad de agua necesaria. Continúe agitando hasta antes de iniciar la aplicación. Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g/cil.)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
TOMATE	Moho gris	*Botrytis cinerea*	500	3	*3 **1.5

PC: Período de carencia en días. **LMR:** Límite máximo de residuos en partes por millón. *Fludioxonil, **Cyprodinil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las aplicaciones se pueden realizar desde la floración y durante la fructificación ya que el tomate es un cultivo de constante floración incluso paralela a la formación de los frutos.

PERÍODO DE REINGRESO. No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: POSEIDON es compatible con plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Versión 1

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA